

нотума между шипами блестящая, почти гладкая, со слабыми намеками на поперечную штриховатость. Лобная площадка почти гладкая, блестящая; точно такъ же блескомъ отличается и прилегающая часть личного щитка между его продольными ребрышками. Челюстные щупальца 6-члениковые; первые 3 членика и послѣдній приблизительно равной длины, 4-ый же и въ особенности 5-ый, короче. Губные щупальца 4-члениковые; 1-ый членикъ равенъ по длинѣ двумъ послѣднимъ вмѣстѣ взятымъ, а 2-ой короче.

♀. Жвалы съ 8—9 зубцами, при чемъ 9-ый зубецъ зачаточный. Челюстные и губные щупальца такія же, какъ и у ♀. Лобная пло-




Рис. 4. *Myrmica scabrinodis* Ny l.

А — профиль торакса и стемелька ♀ и ♀ изъ Ирке-кашка Ферганской обл. — В — тоже ♀ и ♀ изъ дер. Журовка Елисаветградскаго у. Херсонской губ. — ♂ А; А. G. — половые клапаны ♂ изъ Ирке-кашка. — ♂ В; А. G. — тоже ♂ изъ дер. Журовки.

щадка нѣжно-продольно-штриховатая. Шипы эпинотума (А ♀) чуть короче, чѣмъ у ♀, широкіе при основаніи, равномерно заостренные,

бург'a, тогда какъ у представителей изъ Елисаветградскаго уѣзда (тогъ же рис. — ♀ В) они нѣсколько болѣе длинныя, а у представителей изъ Vaud особенно длинныя, тонкіе и прямые, вродѣ того, какъ это представлено у Emery (loc. cit., p. 176, fig. 10 c) для var. *sabuleti* Mein. У елисаветградскихъ представителей профиль узелка перваго членика стемелька (см. рис.) представляет то отличіе, что вершина его образуетъ несравненно болѣе острый уголъ, сильнѣе выдающійся впередъ; верхняя поверхность его болѣе прямая.