

прямые. Переднія крылья съ одной большой кубитальной и маленькой дискоидальной клѣточками, при чемъ кубитальная спереди раздѣлена неполной продольной жилкой, продолжающейся и внѣ этой клѣточки<sup>9)</sup>.

♂. Рукоять усиковъ нѣсколько короче  $\frac{1}{4}$  длины жгутика; конечные членики переходятъ въ проксимальные постепенно, но все же на счетъ булавы можно отнести 5 члениковъ. Лобная площадка матовая, зернистая. Личной щитокъ слабо-блестящій. Челюстные щупальца 6-члениковыя, съ 5-мъ членикомъ болѣе короткимъ; губныя 4-члениковыя съ первыми двумя члениками болѣе длинными и двумя послѣдними болѣе короткими. Среднеспинка мѣстами болѣе или менѣе нѣжно-продольно-штриховатая, впереди между косыми линиями почти гладкая, но съ точками; по Рузскому, среднеспинка въ большей своей части гладкая и блестящая. Нуроругиумъ имѣетъ такой видъ, какъ это представлено мною для *Myrmica rubra ruginodis* Nyl. (Nachtrag zu meinen „Ameisen aus Transkaspien und Turkestan“, Русск. Энт. Обзор., 1909, стр. 270, фиг. 1 — Нр. x). Половые клапаны изображены на прилагаемомъ рисункѣ (AG. A); средний клапанъ съ тремя отростками, изъ которыхъ дистальный задній наиболѣе длинный и загнутъ внизъ. Переднія крылья съ почти такимъ же жилкованіемъ, какъ и у ♀, но продольная неполная жилка кубитальной клѣточки не всегда составляетъ непосредственное продолженіе продольной жилки, лежащей внѣ клѣточки. Въ остальномъ соответствуетъ описанію Рузскаго<sup>10)</sup>.

Изъ признаковъ описываемыхъ представителей, отличающихъ ихъ отъ указанныхъ въ примѣчаніяхъ представителей нѣкоторыхъ другихъ мѣстностей, обращаютъ на себя вниманіе главнымъ образомъ форма узелка перваго членика стебелька и особенности строенія средняго полового клапана. Въ виду недостаточной изученности многочисленныхъ формъ *scabrinodis*, я воздерживаюсь въ данномъ случаѣ отъ установленія новой разновидности.

Ирке-кашка на р. Араванъ Ферганской обл., 19. VII. 14 Б. Сварчевскій. Подъ камнемъ. ♀♀, крылатая ♀♀ и ♂♂.

<sup>9)</sup> ♀♀ изъ Елисаветградскаго у. отличаются слѣдующими признаками: лобная площадка гладкая; шипы эпинотума (BQ) нѣсколько крупнѣе и чуть загнуты внизъ; профиль узелка перваго членика стебелька представляетъ то же отличіе, что и у ♀, хотя передній уголь здѣсь менѣе острый.

<sup>10)</sup> ♂♂ изъ Елисаветградскаго у. отличаются слѣдующими признаками: передній участок среднеспинки очень гладкій и блестящій, но также съ точками (по Рузскому среднеспинка въ большей своей части гладкая и блестящая); проксимальный отростокъ средняго полового клапана (AG. B) представляетъ собою лишь небольшой бугорокъ, а болѣе короткій (передній) изъ двухъ дистальныхъ отростковъ болѣе длинный и на концѣ нѣсколько утолщенный.