

nach ausgezogen, wobei sie oben hinten ganz fehlen. Das erste Gastersegment ist oben glatt und glänzend, an den Seiten schief (von vorn und oben nach hinten und unten) fein und dicht längsgestrichelt. Ziemlich dicht mit langen abstehenden Haaren bedeckt, welche aus den Punkten heraussprossen. Beine mit spärlichen länglichen haartragenden Punkten. Die Coxae des hinteren Beinpaares mit stark entwickeltem sichelförmigem Anhang, wie bei *coxalis* Rog. Gleichmäßig rötlichbraun, mit etwas lichter Haaren. Im allgemeinen glänzend. Länge 6 mm.

Die Skulptur erinnert sehr an *coxalis*, in anderen Beziehungen ist aber die Art sehr verschieden. Der allgemeine Körperbau viel schlanker als bei der genannten Art.

Buitenzorg, Botan. Garten, Einzelläufer.

Tribus Ponerini Forel.

Centromyrmex feae Em.

♀. Obschon meine Exemplare von Ceylon stammen, so fehlen ihnen doch die von Forel angegebenen Merkmale der var. *ceylonica*. Der Kaurand der Mandibeln trägt der ganzen Länge nach kleine, aber gut unterscheidbare Zähnchen und der Knoten des Petiolus ist nicht 2 mal sondern $1\frac{1}{2}$ mal so breit wie lang. Länge 4,5 mm.

Ceylon, Kandy, 10. XI. 1912, O. John, 3 ♀.

Odontoponera transversa F. Sm.

♀. Maxillartaster 4-gliedrig. Das 1. Gliedchen kurz und dick, die übrigen dünn. Deren Länge in $\mu\mu$: 104+168+88+128. Lippentaster ebenfalls 4-gliedrig. Die Länge der Gliedchen in $\mu\mu$: 192+120+112+120.

Buitenzorg, Botan. Garten, Nr. 2760, ♀ ♀. — Tjobodas, Nr. 2707, ♀ ♀. — Tjampea, Nr. 2389, 2390, ♀ ♀. — Depok, Nr. 2724, ♀ ♀.

(Fortsetzung folgt.)