

de gênero do primeiro e permite, pela primeira vez, a formulação do diagnóstico genérico do macho de *Eucryptocerus*:

Macho — Tegumento muito opaco, sobretudo na cabeça, no tórax e nos segmentos pedicelares. Cabeça, incluindo os olhos compostos, mais larga que comprida. Mandíbulas triangulares, com borda externa pouco convexa, com 2 dentes apical e pré-apical maiores e outros 4-5 dentes muito menores na borda masticatória. Fórmula palpal 5, 3. Antenas com 13 segmentos. Escapo muito mais curto que o 2.º segmento funicular. Olhos grandes, semi-esféricos, prominentes. Escudo mesotorácico com sulcos de Mayr e suturas parapsidais. Face basal do epinoto com lobos triangulares salientes nos ângulos posteriores, separados um do outro por chanfradura profunda. Segmentos pedicelares subcilíndricos, quase tão compridos que largos. Gáster fusiforme; tergito I nitidamente mais comprido que largo. Tíbias médias e traseiras sem esporão apical. Asa anterior com célula radial fechada e apendiculada, com célula discoidal fechada, sem nervura cubital transversa, tocando-se num ponto as nervuras radial e cubital.

Próximo de *Cephalotes* Latreille e *Zacryptocerus* Wheeler, distingue-se destes o macho de *Eucryptocerus* principalmente pelo tegumento mais opaco, pela forma do epinoto, pelos segmentos pedicelares mais alongados, pelo 1.º tergito do gáster, mais comprido que largo e levemente chanfrado na base.

***Eucryptocerus placidus* (Fr. Smith) comb. n.**

(Figs. 1, 4-7)

- Cryptocerus placidus* Fr. Smith, 1860, *J. Ent.*, 1:76 (macho; Brasil: "St. Paul").
 — Fr. Smith, 1862, *Trans. Ent. Soc. London*, (3) 1, Pr. 12, fig. 4 (macho).
Cephalotes placidus, Emery, 1922, *Gen. Ins. Subf. Myrmicinae*, 174c: 304. —
 Kempf, 1951, *Rev. Ent.*, 22:127.
Cephalotes opacus Santschi, 1920, *Bull. Soc. Ent. France*: 147-148 (operária;
 Guiana francesa: St. Jean du Maroni). — Nov. Syn.
Eucryptocerus opacus, Kempf, 1951, *Rev. Ent.*, 22:131 (operária; Brasil, Amazonas: Rio Toara, Paraná; Peru: La Sombra).

Tipo — Macho proveniente de "St. Paulo" = São Paulo de Olivença no alto Amazonas, provavelmente capturado por H. W. Bates [HDOX].

Macho (holótipo) — Comprimento total 9,7 mm; comprimento da cápsula cefálica 1,45 mm; largura da cabeça, incluindo os olhos compostos, 2,21 mm; comprimento do tórax 3,12 mm; comprimento da asa anterior 7,6 mm. Prêto; segmentos funiculares II-XII, patas, exceto coxas, e gáster ferrugíneos. Tegumento opaco, fina e densamente pontilhado; 1.º tergito do gáster, sobretudo no centro, e patas, sobretudo na face extensora dos fêmures, com escultura mais apagada e um pouco brilhantes. Cabeça com fovéolas maiores, rasas e esparsas; com curtíssimas rugas radialmente dispostas em tórno dos olhos; occipício