

cefalo-torácico 62-70. — Cór comò na operária. Lobo mediano do clipeo (Fig. 20) mais distintamente chanfrado anteriormente que em *terminatus*, mais saliente. Pronoto com ângulo escapular (Fig. 25) agudo e saliente, as bordas laterais subparalelas e côncavas atrás do ângulo escapular. Peciolo com um mínimo de 4 cerdas erguidas. Asas desconhecidas.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA. — A presente espécie parece substituir *termitarius* no Oeste e Sul do Paraguai, no Sul da Bolívia, no Norte e Noroeste da Argentina, excetuando-se a Província Misiones. A situação na zona de contacto entre ambas as espécies ainda não foi esclarecida. A informação de Emery (1905), que registra de Coxipó, Mato Grosso, Brasil, parece duvidosa.

MATERIAL EXAMINADO: 31 operárias e 3 fêmeas, de procedência seguinte: *Operárias.* — Bolívia: Valle Grande (R. P. Alcalá), loc. desconhecida, [?Cochabamba] (H. Marcus), Tarija [DDSV, WWK, ML]. — Paraguai: Asunción, Dt. Central, S. Lorenzo [ML, WWK]. — Argentina, Córdoba: Carlos Paz [ML]; Chaco: R. Saenz Peña [ML]; Formosa: Gran Guardia [ML, WWK]; Salta: Las Termas [ML]; Tucumán: V. Padre Monte, Tucumán, Trancas, S. Pedro de Colatau [ML, WWK]. — *Fêmeas.* — Argentina, Jujuy: Dique la Cienaga [ML]; Salta: 6 km hacia S. Lorenzo [ML]; Tucumán: V. Padre Monte [WWK].

DISCUSSÃO. — Já ficou salientada a extrema afinidade entre *denticollis* e *termitaria*, afinidade esta que se manifesta tanto na morfologia como na biologia excepcional. Os caracteres diferenciais, apontados acima, em geral, permitem a separação sem dificuldade. Cumpre porém insistir no fato que ambas as formas concordam nos característicos mais importantes, diria essenciais: a dentição peculiar das mandíbulas que têm o dente basal não retraído, a forma do clipeo, a configuração do tórax e do peciolo e a disposição das cerdas especializadas.

A fim de elucidar ainda melhor o grau de divergência e concordância de caracteres entre as duas espécies, *termitarius* e *denticollis*, organizei os quadros I-III e os gráficos I-IV, que apresentam a frequência e o âmbito de variabilidade dos valores de índices cefálico, óculo-cefálico e torácico para cada uma das formas. Propositamente limitei-me, nesse estudo dos caracteres quantitativos, a um levantamento estatístico muito rudimentar. Pois o escasso material disponível de operárias de *denticollis*, apenas 31 exemplares, não permitiu que seleccionasse uma amostra em regra. Tive de lançar mão de todos os espécimes. Quanto a *termitarius*, fiz uso de todo o material disponível proveniente de 10 áreas geográficas distintas e sucessivas, ao todo 123 indivíduos.

Nos quadros I-III os dados são dispostos conforme regiões geográficas. Percebe-se, à primeira vista, que não existe, nem dentro de cada grupo, nem entre ambos os grupos, uma transição gradual