



Gráfico III

Distribuição de frequência de índice torácico de *Ps. denticollis* e *Ps. termitarius*.

### *Pseudomyrmex excavatus* (Mayr)

(Figs. 6, 8, 13, 18, 23, 28, 32)

*Pseudomyrma excavata* Mayr, 1870, Sitz.-ber. Akad. Wiss. Wien 61: 407, 410-411 (O; Colômbia). — Forel, 1899, Biol. Centr.-Amer. Hym. 3:90, Pr. 4, fig. 5 (O; México, Tabasco: Teapa; Costa Rica; Panamá: Bugaba; Colômbia). — Forel, 1905, Ann. Soc. Ent. Belg. 49:158 (Venezuela: Las Trincheras, La Moka). — Wheeler, 1922, Amer. Mus. Novit. n. 45, p. 4 (Ilha de Trinidad).

*Pseudomyrma excavata* var. *flaviventris* Emery, 1896, Boll. Mus. Zool. Torino 11:2 (O; Panamá: Golfo de Darien; Venezuela; Colômbia). — Forel, 1906, An. Soc. Ent. Belg. 50:229 (Colômbia; Narancho, Tierra Caliente, S. Antônio). — Forel, 1907, Mitt. Nat.-hist. Mus. Hamburg 24:7 (Colômbia: Sabanilla). — Forel, 1912, Mém. Soc. Ent. Belg. 20:19 (Colômbia: Santa Marta, Calabasso; Venezuela: Puerto Cabello). *Nov. Syn.*

*Pseudomyrma excavata* var. *fusciceps* Santschi, 1931, Rev. de Ent. Rio, 1:271 (O; Panamá: France Field). *Nov. Syn.*

*Pseudomyrma tenuis* var. *guatemalensis* Enzmann, 1945, Psyche 51 (3/4):64, 92 (O; Guatemala: Escuintla). *Nov. Syn.*

Tiros. — Operárias de localidade desconhecida da Colômbia, na Col. Mayr, no Museu de História Natural de Viena, Áustria. Lugar de depósito dos tipos das variedades: *flaviventris*, na Coleção Emery, Museo Civico di Storia Naturale di Genova, Itália; *fusciceps*, provavelmente na Col. Santschi, no Museu de