

Basel, Suíça; *tenuis* var. *guatemalensis* na Col. Haskins, Nova York. Não consegui ver e examinar êsses espécimes.

OPERÁRIA. — Comprimento total 6,0-7,1 mm; comprimento da cápsula cefálica 1,18-1,36 mm; largura da cápsula cefálica 1,18-1,29 mm; comprimento do tórax 1,68-1,86 mm. Índices: cefálico 93-100; óculo-cefálico 60-68; torácico 45-48; céfalo-torácico 70-75. — Cór variável, mas sempre em parte de amarelo acastanhado (para detalhes cf. infra, sob: Variação!). Tegumento menos ásperamente esculpido e um pouco mais brilhante que em *termitarius* e *denticollis*.

Cabeça (Fig. 13) subcircular. Mandíbulas mui finamente estrioladas na base e bastante lisas e brilhantes no ápice; borda másticatória com dente basal retraído (Fig. 6). Lobo mediano do clipeo tectiforme, com a borda anterior ligeiramente convexa e a carena central saliente em forma de denticulo. Distância interocular menor que o comprimento máximo dos olhos. Tórax (Fig. 8) mais alto que em *termitarius*. Pronoto plano ou, raramente, um pouco côncavo, trapeziforme (Fig. 18), bastante mais largo na frente que atrás, com os ângulos escapulares salientes, as bordas laterais nitidamente marginadas e um tanto salientes, convergindo conspicuamente para trás. Bordas ântero-laterais da face basal do epinoto marginadas, divergindo para trás até o nível dos estigmas. Mesonoto e face basal do epinoto, vistos de perfil, não se situam no mesmo plano, formando ângulo muito obtuso. Pecíolo de forma característica (Fig. 8), muito comprimido, com a face dorsal, de perfil, continuamente arcual, sem formar ângulo ou dentes atrás, acima da face posterior; fracamente pedunculado, com pequeno dente agudo ântero-ventral. Bordas superiores nitidamente marginadas, a face superior às vezes levemente canelada longitudinalmente, de cór mais clara que as faces laterais. Pós-pecíolo subcônica e piriforme. Pilosidade erguida como em *termitarius*, mas faltam as cerdas nos ângulos escapulares e, geralmente, na borda posterior do pós-pecíolo.

FÊMEA (ainda não descrita). — Comprimento total ca. 7,5 mm; comprimento da cápsula cefálica 1,39-1,43 mm; largura da cápsula cefálica 1,18-1,21 mm; comprimento do tórax 2,10-2,21 mm. Índices: cefálico 83-85; óculo-cefálico 60-62. Caracteres diferenciais como na operária: dente basal das mandíbulas retraído (Fig. 23), lobo mediano do clipeo com borda fracamente convexa e denticulada no meio, distância interocular menor que o comprimento do olho. Pronoto (Fig. 28), em vista dorsal, como em *termitarius*, sem ter os ângulos escapulares salientes como em *denticollis*. Pecíolo (Fig. 32) como na operária, mas ainda menos distintamente pedunculado. Pilosidade ereta como na operária, mas com cerdas erguidas esparsas no pronoto e no escudo mesonotal. Asas hialinas, com nervuras pálidas, obedecendo ao traçado comum neste grupo (Cf. Figs. 30, 31).

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA. — Conforme os dados atuais, a presente espécie ocorre desde a baía de Campeche no México meridional (Estados de Vera Cruz, Tabasco e Campeche) até o Norte do continente sul-americano, onde foi assinalada sua presença nos seguintes países: Equador, Colômbia, Venezuela e Ilha de Trini-