

dad. Mann (1916) e Wheeler (1923) registraram-na também de Manáus, Estado do Amazonas, Brasil. Segundo uma comunicação do Dr. Brown, que examinou os espécimes de Mann, trata-se de exemplares um pouco aberrantes de *tenuis*. Voltarei a falar delas quando discutir esta espécie mais abaixo.

MATERIAL EXAMINADO: 24 operárias e 11 fêmeas, como segue: *Operárias*. — Equador: proximidades do Rio Bamba (W. v. Hagen) [MCZ]. — Colômbia: Cartagena (P. J. Darlington) [MCZ]. — Ilha de Trinidad: pequenas séries e exemplares avulsos de Mt. Tucuche, Port of Spain e Balandra Bay (R. Thaxter, P. J. Darlington) [WWK, MCZ]. — Zona do Canal do Panamá: Ilha de Barro Colorado, série pequenas coletadas entre 1924 e 1935 (W. M. Wheeler, P. J. Darlington, W. C. Allee, E. Hare) [MCZ, WWK]. — Guatemala: Los Amatos (Kellerman) [MCZ]. — México, Campeche: perto de Campeche (E. O. Wilson); Vera Cruz: Pueblo Nuevo, perto de Tetzonapa (E. O. Wilson) [MCZ, WWK]. — *Fêmeas*. — Todos os exemplares do mesmo ninho, México, Campeche: perto de Campeche (E. O. Wilson) [MCZ, WWK].

DISCUSSÃO. — Um bom número de caracteres, já assinalados anteriormente na descrição de *termitarius*, separa *excavatus* desta espécie e de *denticollis*. De outro lado *excavatus* mostra extrema afinidade para *tenuis*, de que se separa praticamente, como Mayr já salientou em 1870, apenas pela configuração do pecíolo. Tratarei dêste assunto na discussão de *tenuis*.

VARIAÇÃO E SINONÍMIA. — Já na descrição original de *excavatus*, Mayr chamou atenção sôbre a grande variabilidade quanto à cor, manifestada pelo material que tinha à mão, todo êle proveniente da Colômbia. Caracterizou quatro tipos principais de coloração, que menciono a seguir, acrescentando ainda outros:

1) Todo o inseto é castanho com amarelo-avermelhado. Seria, segundo Mayr, a variedade mais comum na Colômbia. Indivíduos do México, (Pueblo Nuevo, Vera Cruz) apresentam êste tipo de coloração.

2) Cabeça, antenas, pronoto, tibias e tarsos de amarelo claro, o resto do corpo castanho com amarelo avermelhado. Espécimes de Trinidad, Guatemala e México (Campeche) aproximam-se muito dêste tipo, que aliás pouco difere do precedente.

3) O colorido básico é preto; os ângulos posteriores da cabeça, os lados do pronoto com manchas indistintas de castanho avermelhado; mandíbulas, antenas, pós-pecíolo, gáster, tibias e tarsos amarelados. Mayr viu apenas um exemplar. Todavia Emery (1896) recebeu indivíduos semelhantes recebidos de Punta Savannah, Golfo de Darien, Panamá, exibindo a mesma combinação de cores. Deu-lhes o nome de var. *flaviventris*. Não vi nenhum exemplar que retratasse exatamente esta condição.