

**Insecta Amapaensia. — Hymenoptera: Formicidae
(Segunda Contribuição)**

Por Walter W. Kempf, O. F. M., São Paulo, Brasil
(Bolsista do Conselho Nacional de Pesquisas)

(Com 12 figuras)

Copioso material de formigas, perfazendo mais de 400 espécimes de 37 gêneros e 94 espécies, colecionado no Amapá nos meses de junho a agosto de 1959 pelo Prof. John Lane, oferece novo ensejo para tratar da mirmecofauna deste território brasileiro. O acervo é ainda acrescido de outro material colecionado em Oiapoque, em maio de 1959, pelo Tte.-Cel. Moacir Alvarenga, e em Serra do Navio, a partir de setembro de 1959, pelo sr. Renato Bicelli. Agradeço aos colecionadores o donativo das formigas interessantes, que foram depositadas na minha coleção particular (WWK).

Com esse novo material o número de espécies de formigas, verificadas até agora no Amapá, sobe a 141, que se distribuem por 51 gêneros. O presente trabalho registra 43 espécies ainda não mencionadas em artigo anterior (Kempf, 1959). Esta cifra inclui 4 espécies novas para a ciência, cuja diagnose se encontra nas páginas que se seguem. Estabeleço, outrossim, um novo sinônimo para *Neoponera striatinodis*.

Infelizmente, tive que deixar de lado 40 espécies, cuja identificação não pôde ser feita com segurança, quer devido à falta das castas decisivas, quer devido à situação confusa da taxonomia de alguns gêneros. Estas espécies, todavia, foram incluídas no elenco sinóptico das formigas do Amapá, que elaborei a fim de dar uma idéia da composição da fauna mirmecológica do território, segundo o estado atual dos nossos conhecimentos. Escusa explicar que o quadro não retrata, nem de longe, a riqueza real da fauna amapaense.

Devo ainda acrescentar que, nas descrições, o comprimento total consiste na soma das medidas da cabeça com mandíbulas fechadas, do tórax (medida de Weber), do pecíolo e do gáster.