

tórax, pecíolo e gáster cobertas de grossas e regulares estrias longitudinais. Estrias um pouco divergentes para os lados posteriormente na face superior da cabeça, com cêrca de 22 estrias entre os olhos compostos; fortemente convergindo anteriormente, em parte fundindo-se com as do lado oposto na face gular da cabeça. Estrias do tórax ainda mais grossas, com cêrca de 16 na face dorsal do promesonoto que carece de estrias transversais na borda anterior; 6 estrias entre os espinhos epinotais que descem pela face declive. Mesopleura com cêrca de 12 estrias horizontais. Pecíolo, visto de cima, com 13 estrias transversais. Tergitos I e II do gáster com estrias um pouco mais finas que em *menozzii* e *schubarti*, havendo cêrca de 30 na margem posterior do primeiro tergito ("pós-pecíolo"). Esternito do primeiro segmento gástrico com estrias formando arcos transversais, i. é, as estrias convergem anteriormente e se fundem com as do lado oposto.

Corpo com pilosidade fina e ereta esparsa; escapos e patas com pêlos um pouco mais densos e oblíquos.

Tipo. — Uma operária (holótipo) do rio Amapari, km 180, Território do Amapá, Brasil, colecionada em 8 de julho de 1959 pelo Prof. John Lane, a quem a espécie é dedicada. Depositada na minha coleção (WWK).

Discussão. — Pelas mandíbulas triangulares e estriadas, *G. lanei* faz parte do grupo de *rastrata* Mayr (outrora o subgênero *Parectatomma*). Devido às estrias mais grossas do corpo é próxima de *menozzii* Borgmeier e *schubarti* Borgmeier. Contudo difere destas duas espécies no tamanho menor, na forma da cabeça, no comprimento do escapo, na forma e escultura do pecíolo e na escultura do primeiro esternito do gáster. A forma e escultura do pecíolo avizinha a presente espécie a *mecotyle* Brown. Esta, porém, sob outros aspectos, difere consideravelmente, p. ex. na cor castanho-avermelhada, na escultura mais irregular e sobretudo na faixa de estrias transversais próxima à margem anterior do pronoto, na face superior estriada do escapo e na face declive do epinoto lisa e brilhante. As estrias menos numerosas e mais grossas, além da forma e escultura do pecíolo, separam facilmente *lanei* de *aculeaticoxa* Santschi e *triangularis* Mayr.

***Gnamptogenys annulata* (Mayr, 1887)**

Uma operária isolada de Serra do Navio (R. Bicelli col.).

***Gnamptogenys pleurodon* (Emery, 1896)**

Três operárias avulsas, uma do rio Amapari, km 185, duas do rio Felício (J. Lane col.). A espécie faz parte do grupo de "*Holcopena*" (pôsto em sinonímia de *Gnamptogenys* por Brown, 1958) e acha-se amplamente distribuída na bacia amazônica.