

Subfamília *Pseudomyrmecinae* M. R. Smith*Pseudomyrmex godmani* (Forel, 1899)

Uma operária do braço-sul do rio Anicoí (J. Lane e R. Bicelli col.). A espécie, que só se conhecia do Panamá e do Rio de Janeiro, é uma das mais características deste gênero difícil. O presente exemplar tem as antenas e patas bastante escurecidas, quase pretas, apresentando somente no pós-pecíolo e nas mandíbulas a cor castanha. Índice cefálico 121; índice óculo-cefálico 56.

*Pseudomyrmex semotus*, n. sp.

(Figs. 4-6)

Operária (holótipo). — Comprimento total 6,8 mm; comprimento da cápsula cefálica 1,45 mm; largura da cápsula cefálica, incluindo os olhos compostos 1,77 mm; comprimento do tórax (medida de Weber) 2,03 mm. Índices: cefálico 122, óculo-cefálico 65, torácico 50, céfalo-torácico 72. Prêta; mandíbulas, ápice das antenas, tarsos fusco-castanhos.

Mandíbulas subopacas com finíssimas e densas estrias longitudinais e esparsos e grossos pontos pilíferos. Cabeça (Fig. 4) transversal. Lobo central do clipeo pouco saliente, com borda anterior reta, gentilmente convexo em sentido transversal sem apresentar uma quilha mediana longitudinal desenvolvida. Olhos muito grandes, em posição posterior, muito salientes, seu diâmetro máximo pouco menor que a distância interocular mínima (26:29), cobertos de pêlos esparsos, cujo comprimento iguala a metade da grossura mínima do escapo.

Pronoto e mesonoto transversais, o último um pouco menos que duas vezes mais largo que comprido (22:12). Face dorsal do tórax muito plana, conspicuamente marginada nos lados. Ombros arredondados. Sutura meso-epinotal estreita, impressa.

Pecíolo brevemente pedunculado (Figs. 5-6) com nó alto, fortemente dilatado nos lados; visto de perfil, subtriangular com o ápice largamente arredondado e o lado posterior subreto e vestigialmente escavado. Dente ântero-ventral presente. Pós-pecíolo transversal, grosso, sua largura máxima atrás da metade, distintamente menor que o dobro do comprimento máximo (22:16). Face anterior subtruncada.

Subopaca, finamente reticulado-pontilhada. Dorso da cabeça e do tórax, incluindo a face declive do epinoto, mais àspe-