

***Pheidole radoszkowskii* Mayr, 1884**

Três soldados e uma operária do braço-sul do rio Anicoí (J. Lane e R. Bicelli col.). Pelo pequeno tamanho, êstes espécimes se parecem mais com a forma típica da espécie variável, proveniente de Cayenne, Guiana Francesa.

***Crematogaster (Orthocrema) amapaensis*, n. sp.**

(Figs. 7-9)

*Operária* (holótipo). — Comprimento total 2,7 mm; comprimento da cápsula cefálica 0,67 mm; máxima largura da cabeça incluindo os olhos compostos 0,71 mm, sem os olhos 0,65 mm; comprimento do escapo 0,78 mm; máximo diâmetro dos olhos 0,16 mm; comprimento do tórax (medida de Weber) 0,81 mm; comprimento dos espinhos epinotais (a partir duma perpendicular traçada através da borda posterior do espiráculo epinotal até o ápice do espinho) 0,28 mm. Côr castanha mais ou menos escurecida; face basal do epinoto e gáster, exceto o primeiro tergito castanho, negros; tarsos castanho-testáceos.

*Cabeça* (Fig. 7) subcircular. Mandíbulas lisas, quadridentadas. Clípeo sublúcido, vestigialmente pontilhado-reticulado com leves e espaçadas cóstulas longitudinais. Área frontal ausente. Sulco frontal vestigial, indicado por traço liso e estreito. Carenas frontais curtas, levemente divergindo para trás. Dorso da cabeça subopaco, fina e densamente pontilhado-reticulado com rúgulas predominantemente longitudinais, estas mais grossas e mais distintas nas bochechas. Face gular lisa e brilhante. Olhos situados um pouco atrás da metade da cabeça. Escapos mais longos que a cápsula cefálica, delgados, com algumas rugas longitudinais. Todos os segmentos do funículo bem mais compridos que largos; clava apical de dois segmentos.

*Tórax* (Figs. 8-9) com espaçadas cóstulas longitudinais no dorso (incluindo a face basal do epinoto), os intervalos mais ou menos lisos e brilhantes, às vezes vestigialmente reticulado-pontilhados, principalmente na frente. Laterotergito do pronoto e face declive do epinoto lisos e brilhantes. Mesopleura reticulado-rugosa, restante do tórax fina e horizontalmente estriada. Mesonoto ladeado por quilhas levantadas, subparalelas, agudas que, vistas de perfil apresentam um ângulo obtuso na metade, continuando atrás nos lados da face basal do epinoto. Sutura meso-epinotal impressa, porém não interrompendo