

Francesa e Inglesa e, no Brasil, dos Estados do Amazonas e do Mato Grosso.

**Eucryptocerus abdominalis** (Santschi, 1929)

Duas operárias do braço-sul do rio Anicoí (J. Lane e R. Bicelli col.). Desta formiga conhecem-se poucos exemplares. O tipo é da Guiana Francesa. Vi espécimes do Pará e da Bolívia (Kempf, 1951).

**Paracryptocerus cordatus** (Fr. Smith, 1854)

Um soldado do rio Anicoí (J. Lane e R. Bicelli col.). A espécie ocorre no vale do Amazonas. Há pouco, recebi uma operária de São Luís, Maranhão.

**Acromyrmex coronatus** (Fabricius, 1804)

Uma operária média do braço-sul do rio Anicoí (J. Lane e R. Bicelli col.). Esta é a "quem-quem de árvore", típico habitante das florestas. Ocorre quase em todos os Estados do Brasil, com exceção talvez do Rio Grande do Sul.

Subfamília **Dolichoderinae** Forel

**Dolichoderus decollatus** Fr. Smith, 1858

Duas operárias avulsas de Serra do Navio (R. Bicelli col.). Espécie da Amazônia que também ocorre no litoral-norte do Brasil, até o sul do Estado da Baía.

**Monacis septemspinosa** (Emery, 1894)

Uma operária do braço-sul do rio Anicoí (J. Lane e R. Bicelli col.). No Brasil, o território desta formiga coincide com o da espécie precedente.

**Hypoclinea bidens ferruginea** (Forel, 1903)

Bom número de operárias de Serra do Navio, do braço-sul do rio Anicoí e do rio Felício (J. Lane e R. Bicelli col.). Trata-se, provavelmente, de espécie distinta de *bidens* com a qual ocorre simultaneamente, lado a lado, no mesmo território. Como o gênero necessita de urgente revisão, não pretendo modificar aqui o estado sistemático desta forma.

**Hypoclinea analis** (Emery, 1894)

Uma operária do rio Felício (J. Lane col.). Espécie comum da Amazônia, muito próxima de *gibbosa* Fr. Smith.