

Dendromyrmex nidulans (Fr. Smith, 1860)

Três operárias do braço-sul do rio Anicoí (J. Lane e R. Bicelli col.). Estes exemplares, embora completamente ferrugíneos, aparentemente pertencem à presente espécie, devido à escassa pilosidade apressa no gáster esculpido e fôscos.

Referências

- Borgmeier, T., 1953, Vorarbeiten zu einer Revision der neotropischen Wanderameisen. — *Studia Entomologica*, Nr. 2, 51 pp., 35 figs.
— 1955, Die Wanderameisen der neotropischen Region. — *Studia Entomologica*, Nr. 3, 717 pp., 87 pr.
— 1958, Nachtraege zu meiner Monographie der neotropischen Wanderameisen. — *Stud. Ent.* 1: 197-208, 8 figs., 2 pr.
Brown, W. L., Jr., 1958, Contributions toward a reclassification of the Formicidae II. Tribe Ectatommini. — *Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard*, 118 (5): 175-362, 48 figs.
Emery, C., 1890, Studi sulle formiche della fauna neotropica I-V. — *Bull. Soc. Ent. Ital.*, 22: 38-80, pr. 5-9.
— 1894, Studi sulle formiche della fauna neotropica VI-XVI. — *Bull. Soc. Ent. Ital.*, 26: 137-242, pr. 1-4.
Kempf, W. W., 1951, A taxonomic study on the ant tribe Cephalotini. — *Rev. de Ent.*, 22: 1-244, 16 pr.
— 1958, Estudos sobre *Pseudomyrmex* II. — *Stud. Ent.* 1: 433-462, 33 figs.
— 1959, Insecta Amapaensia. Hymenoptera: Formicidae. — *Stud. Ent.* 2: 209-218.
Mann, W. M., 1916, The ants of Brazil. — *Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard*, 60: 399-490, 7 pr.
Weber, N. A., 1938, New ants from stomachs of *Bufo marinus* L. and *Typhlops reticulatus* (L.). — *Ann. Ent. Soc. Amer.* 31: 207-210.
Wheeler, W. M., 1923, Formiciden, in: *Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman im Amazonas 1914-1915.* — *Ark. f. Zool.* 15, n. 7, pp. 1-6.