

segmento das antenas e consiste na distância retilínea entre a base, excluindo-se a cabeça articular esférica e destacada, e o ápice. *Comprimento do tórax* (medida de Weber) é obtido em vista lateral e consiste na distância retilínea entre o ponto mais avançado do pronoto (sem incluir o “pescoço”) e o ângulo pósterio-inferior ou metasternal.

A investigação se baseia em material da minha coleção particular [WWK], da coleção de T. Borgmeier [CTB] e do Departamento de Zoologia da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo [DZSP]. Agradeço a diversos colecionadores o envio de material e ao Conselho Nacional de Pesquisas o auxílio em forma de uma bolsa de estudos.

CHAVE PARA AS ESPÉCIES BRASILEIRAS DE *PACHYCONDYLA*

(Operárias e fêmeas)

1. — Pigídio com três dentes no ápice (Fig. 8) *crassinoda* (Latreille)
— Pigídio terminando numa só ponta, sem dentes laterais 2
2. — Pecíolo curto, muito comprimido de frente para trás, não apresentando de perfil uma face superior distinta da face posterior (Figs. 5, 7), mas descendo em curva gradual e contínua da borda ântero-superior para a articulação do gáster 3
— Pecíolo mais comprido, apresentando de perfil a face dorsal distinta da face posterior (Figs. 12, 13) 4
3. — Fronte da cabeça e dorso do pronoto com grossas estrias logitudinais e regulares; borda anterior do clipeo formando ângulo saliente no meio (Fig. 1) *magnifica* Borgmeier
— Fronte da cabeça pontilhado-rugosa; dorso do pronoto fina e esparsamente pontilhado e muito brilhante; borda anterior do clipeo uniformemente convexa (Fig. 2) *metanotalis* Luederwaldt
4. — Borda lateral da placa dorsal do pronoto obtusamente marginada, sem quilha marcada e aguda 5
— Borda lateral da placa dorsal do pronoto com quilha marcada e aguda 6
5. — Pigídio com escavação médio-posterior lisa, as partes laterais e anteriores com rugas oblíquas e transversais (Fig. 9); borda anterior do clipeo levemente chanfrada no meio (Fig. 3) *impressa* (Roger)
— Pigídio sem escavação médio-posterior, as partes laterais e anteriores sem rugas; borda anterior do clipeo uniformemente convexa (Fig. 4)
..... *lenis*, sp. n.
6. — Segmentos 6-8 do funículo antenal no máximo tão compridos que largos; comprimento do tórax da operária não atingindo 3,5 mm
..... *harpax* (Fabricius)
— Segmentos 6-8 do funículo antenal distintamente mais compridos que largos; comprimento do tórax da operária superior a 3,5 mm
..... *striata* Fr. Smith