

*Pachycondyla crassinoda* (Latreille, 1802)

(Fig. 8)

Esta espécie é a maior do gênero e nitidamente distinta das demais já pela configuração do pigídio na operária e fêmea. As medidas das operárias examinadas variam do modo seguinte: comprimento total 17-20 mm; comprimento da cápsula cefálica 3,6-4,0 mm; largura da cabeça 3,14-3,73 mm; comprimento do tórax 5,0-5,5 mm.

Operárias e fêmeas têm as mandíbulas ao menos parcialmente lisas com 9-10 dentes na borda mastigatória (sem contar dentículas intercalares e vestigiais). O clipeo é truncado na frente e levemente chanfrado no meio. Placa dorsal do pronoto obtusamente marginada nos lados, sem quilhas agudas. Sutura mesoepinotal ausente. Pecíolo cubóide, visto de cima quase tão comprido que largo. Pigídio peculiar, com três dentes no ápice (Fig. 8), escavado e liso entre os dentes laterais, estriado-rugoso na parte basal e nos lados.

Ocorre na Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Trinidad, Guianas e Bolívia. Para o Brasil, a literatura contém os registros seguintes: Pará: Belém (Fr. Smith, 1858 p. 105); Amazonas: Rio Autaz (Wheeler, 1923 p. 2); Guaporé: Pôrto Velho (Mann, 1916 p. 415); Mato Grosso: sem indicação de localidade (Emery, 1890-b p. 71).

Procedência do material brasileiro examinado — Pará: Belém (D. Weil, O.F.M.) 1 operária [WWK], Alto Cuminá (A. J. Sampaio) 1 operária [CTB], Cachimbo (M. Alvarenga) 1 fêmea [WWK], Jacaracanga (M. Alvarenga) 1 operária [WWK]; Amazonas: Barcelos (F. J. Zikán) 2 fêmeas [CTB], Uaupés (antiga S. Gabriel) (F. J. Zikán) 1 operária, 2 fêmeas [CTB], Estirão do Equador, Rio Javari (F. M. Oliveira) 1 operária [WWK]; Rio Branco: Vista Alegre 1 operária [CTB]; Paraíba: Mamanguape (C. A. Camargo Andrade) 1 operária [DZSP], Coremas (C. A. Camargo Andrade) 1 fêmea [DZSP]; Bahia: Itabuna (E. Garbe) 1 operária [CTB]; Goiás: Aragarças (H. Sick) 1 operária [CTB]; Mato Grosso: Chapada dos Guimarães (C. Amann, O.F.M.) 1 operária [WWK]; São Paulo: Juquiá (J. Lane) 1 operária [CTB].

O fato ainda inédito de *P. crassinoda* ocorrer em localidade extra-amazônica, inclusive no sueste do Estado de São Paulo, merece realce especial.

*Pachycondyla fuscoatra* (Roger, 1861)

Esta espécie, cujo tipo procedeu da Colômbia, foi colecionada em Óbidos, Estado do Pará, segundo Forel (1907 p. 1), que pouco antes (1901-b p. 336) descrevera sobre material da Serra de Baturité, Estado do Ceará, a variedade *cearensis*. Como terei oportunidade de mostrar logo mais, esses espécimes, com grandíssima