

me respondeu, comunicando que, há uns anos, estudou o mesmo problema e que chegou a conclusões gerais idênticas às minhas, presentemente expostas.

Resta ainda acrescentar que a *fuscoatra* típica, como seu autor Roger admitiu na diagnose original, talvez não passe de outro sinônimo de *impressa*. A solução desta dúvida depende no entanto do exame do tipo que me não foi acessível.

*Pachycondyla lenis*, sp. n.

(Figs. 4, 6)

Operária (holótipo) — Comprimento total 8,7 mm; comprimento da cápsula cefálica 1,80 mm; largura da cabeça 1,67 mm; comprimento do escapo 1,47 mm; comprimento do tórax 2,52 mm. Preta: mandíbulas, antenas e patas de marrom mais ou menos escurecido.

Cabeça como na fig. 4. Mandíbulas lisas e brilhantes com pontos pilíferos esparsos; borda masticatória com 9 dentes. Clípeo com borda anterior uniformemente convexa, com quilha longitudinal mediana pronunciada e aguda, que se perde na sutura frontal. Lados da cabeça pouco convexos; ângulos occipitais estreitamente arredondados; borda occipital fracamente emarginada. Lobos frontais lisos e brilhantes. Tegumento subopaco, pontilhado e reticulado-ruguloso, com rugas ou estrias longitudinais distintas confinadas ao espaço entre clípeo, fossa antena e olho composto no dorso, faltando por completo nos lados da cabeça.

Tórax como na fig. 6. Placa dorsal do pronoto obtusamente marginada nos lados, sem quilha marcada como em *harpax*. Dorso do tórax liso e brilhante, com pontos mais grossos e esparsos; rugas reticuladas vestigiais somente junto às margens. Sutura mesoepinotal obsoleta. Face declive do epinoto com leves rugas transversais. Lados do tórax subopacos, com finas rugas horizontais. Mesopleura dividida em anepisterno e catepisterno por sutura transversal.

Nó do pecíolo como em *harpax*, mas a face dorsal imarginada anteriormente e nos lados, e o tubérculo ântero-inferior pouco saliente. Face dorsal praticamente lisa com pontos pilíferos finos e raros. Lados com rugas horizontais. Face posterior muito fina e superficialmente reticulada e assás brilhante. Gáster praticamente liso e brilhante, com finíssimos pontos pilíferos que se tornam mais evidentes e grossos nos tergitos posteriores e no pigídio. Este não tem impressão ápico-mediana, mas exhibe no mesmo lugar uma área lisa e brilhante. Pídsidade como em *harpax*.

Operárias (parátipos) — Medidas: comprimento total 8,7-10,3 mm; comprimento da cápsula cefálica 1,80-2,20 mm; largura da cabeça 1,67-1,93 mm; comprimento do escapo 1,47-1,67 mm; comprimento do tórax 2,52-3,07 mm. De resto, concordam com o holótipo em tôdas as características essenciais.

Fêmea (parátipos) — Comprimento total 11,4-11,6 mm; comprimento da cápsula cefálica 2,26-2,34 mm; largura da cabeça 2,13 mm; comprimento do tórax 3,40-3,53 mm. Possui os caracteres diferenciais da operária. A quilha me-