

A / 1087

Rev. Bras. Ent. 11: São Paulo, 15-V-1964

Rev. Bras. Ent. 11: São Paulo, 15-V-1964

UMA NOVA *PLATYTHYREA* DO BRASIL  
(HYM., FORMICIDAE)

WALTER W. KEMPF, O. F. M. (\*)

Convento S. Francisco, São Paulo

O gênero tropicopolita *Platythyrea* Roger (Sub-fam. Ponerinae) conta atualmente cêrca de 40 espécies. As regiões etiópicas e indo-australiana possuem o que há de mais representativo neste grupo, tanto pelo número como pela variedade de formas. Na região neotrópica, porém, registraram-se até o presente só 6 espécies que diferem muito pouco entre si e, em parte, ainda são problemáticas quanto à validade. Recebi, há pouco, do colega Karol Lenko uma pequena série de exemplares do mesmo gênero, provenientes do Mato Grosso. Representam uma espécie ainda inédita e particularmente distinta. Antes de fornecer o diagnóstico da nova espécie quero ainda dar uma lista atualizada de tôdas as formas de *Platythyrea* que ocorrem nas Américas :

1. *angusta* Forel, 1901 — Trinidad, Guianas, Peru, Brasil: Amazônia, Maranhão, Mato Grosso.
2. *exigua* n. sp. — Brasil: Mato Grosso.
3. *incerta* Emery, 1890 — Venezuela, Brasil: Amazônia, Mato Grosso.
4. *meinerti* Forel, 1905 — Venezuela, Guianas, Brasil: Amazônia. *meinerti boliviana* Santschi, 1921 — Bolívia.
5. *punctata* (Fr. Smith, 1858) — USA: Texas, Florida; Antilhas, América Central, Colômbia, (?) Brasil. Sinônimos: *inconspicua* Mayr, 1870; *pruinosa* Mayr, 1870; *cineracea* Forel, 1886.
6. *sinuata* (Roger, 1860) — Guiana holandêsa.
7. *strenua* Wheeler & Mann, 1914 — Haiti

(\*) Bolsista do Conselho Nacional de Pesquisas