

Преподав. Е. Ф. Киселева.

[1925]
Date from
Bolton

On the 2nd floor of the Ussuri region

К фауне муравьев Уссурийского Края.

Помощница заведующего Городским Музеем в г. Красноярске Г. П. Миклашевская в период времени от мая до августа 1919 года собрала небольшую коллекцию муравьев Уссурийского Края и прислала ее для определения проф. М. Д. Рузскому, который передал ее мне.

Уссурийский Край весьма слабо исследован в мирмекологическом отношении, в литературе по этому вопросу имеются только лишь небольшие заметки в работах мирмекологов проф. М. Д. Рузского и проф. А. Фореля и то без указания точных местонахождений, описываемых ими видов, поэтому я взяла на себя труд определить переданную мне коллекцию.

По определению мной Уссурийской коллекции Муравьев, в ней оказались следующие формы:

Сем. *Camponotinae*.

1. *Camponotus herculeanus* L. В смешанном лесу на сопке, 28 мая. 1919 года.

Муравей древоточец широко распространен в Сибири, начиная от Уральского Хребта и до Камчатки.

2. *Camponotus herculeanus whymperi* For.

В смешанном лесу, 28 мая 1919 года.

Распространен в Восточной Сибири, Монголии и Камчатке.

3. *Camponotus herculeanus japonicus* Mayr.

В березовом лесу, на опушке; крылатые самцы и самки (29 мая 1919 г.).

Населяет Восточную Сибирь, Японию, Монголию и Камчатку

4. *Camponotus herculeanus aterrimus* Emery.

В пределах Сибири данный вид распространен только в восточной ее части, доходя на Запад до Верхнеудинска. Населяет также центральную Азию, Тибет и Монголию, являясь характерного центрально-азиатского формою.

5. *Camponotus herculeanus saxatilis* Ruzsky.

Найдены рабочие на Каменистой сопке, на земле и под Камнями, в норах. (30 мая 19 г.)

Данная форма распространена в Европейской России, в восточной полосе ее между Уралом и Волгой и в Сибири от Уральского Хребта и до Тихого Океана.

Этот, живущий на скалах и каменистых склонах муравей медленно и постепенно движется с востока на Запад и в настоящее время по имеющимся сведениям распространение его достигло до бассейна реки Волги.

6. *Acanthomyops (Chthonolasius) flavus* Degeer.

Найдены рабочие особи на пашне, небольшими группами на глубине 2—3 сантиметров, 30 мая 1919 г.

Желтый земляной лазеус распространен в центральной, Западной и Северной части Европейской России и в Сибири, встречаясь здесь