

в губерниях: Тобольской Томской, Акмолинской области, Енисейской губ. и в окрестностях Владивостока.

7. *A. (Donisthorpea) ruger* Lin.

Рабочие найдены: 1) в старом артиллерийском окопе в глинистой почве, 2) в комнате в щелях стен и на полу, 29 мая 1919 года.

Этот обыкновенный и широко распространенный у нас муравей населяет всю Европейскую Россию до Уральского Хребта, всю Сибирь до Тихого Океана.

8. *Formica rufa* Lin. (typ.)

Рабочие на сопке, в хвойном лесу. Населяет всю лесную полосу Европейской России и Сибири.

9. *Formica (Serviformica) fusca* Lin.

Найдены рабочие особи в кучи глины из канавы, около роши. Крылатые особи наблюдались на освещенной солнцем стене дома в 5 часов утра 20 августа.

Чернобурый муравей является типичным лесным муравьем, распространенным в пределах Европейской России, Сибири, Японии, Китая и Туркестане.

10. *T. (Serviformica) fusca picea* Nyl.

Огород, 5 июнь.

Опушение, структура, строение груди как у типичной формы, но у найденных муравьев посреди основной поверхности заднеспишки имеется чуть заметная выемка, что указывает на переход к var. *piceo-implana* Ruzsky.

Такие переходные формы были описаны проф. М. Д. Рузским из Тибета<sup>1)</sup> и Манчжурии.

11. *Plagiolēpis rugmaea manczshurica*. Ruzsky.

Найдено несколько рабочих особей на каменистой сопке, ползавшими на растениях.

Типичная форма в пределах Сибири до сих пор не была встречена, здесь она повидимому заменяется *manczshurica*, которая впервые была найдена в Сибири близ Мукдена<sup>2)</sup>. *Plagiolēpis rugmaea* является типичным средиземноморским видом, в пределах России имеющий споролическое распространение, а именно в Саратовской, Астраханской, Уральской Области, в Крыму и на Кавказе.

Сем. *Dolichoderinae*

12. *Taripoma sessile* (Sav), рабочие найдены на сопке, в смешанном лесу.

Данный вид свойствен восточной Сибири от Уссурийского Края и до Искутской губернии (речка Улунтай, правый приток Слюдянки), а также в Монголии и Китае.

Сем. *Murgicinae*.

13. *Leptothorax (Mychothorax) hirticornis* Em.

Рабочие найдены на склоне правого берега р. Уссури, 18 мая 19 г. Впервые этот вид был указан проф. Форелем<sup>3)</sup> для Восточной Сибири, но без указания точного местонахождения и назвав им. *L.*

<sup>1)</sup> Проф. М. Д. Рузский, О муравьях Тибета и Южной Гобы. Стр. 487, Петроград, 1915 г.

<sup>2)</sup> М. Рузский, Муравьи России стр. 467 Казань, 1905 г. ч. I стр. 468.

<sup>3)</sup> Forêt, Trois notices myrmecologique Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII 1899, стр. 306.