

describió *Oligomyrmex longiceps* Sants. en base del material recogido por Bruch en Alta Gracia (Córdoba). El material contenía machos y obreras solamente (*An. Soc. Cient. Arg.*, 1929, **107**: 295-297).

En el año 1933, el mismo autor describió *Oligomyrmex bruchi* Sants. en base al material procedente de la provincia de Buenos Aires (col. Bruch, 10, III. 1926, n° 1924, ♀), agregando que « c'est peut-être la femelle de *O. longiceps* Sants., le seul *Oligomyrmex* américain connu [*O. panamensis* fué descrito unos años antes N. K.], mais tant que les ♂ n'auront pas été capturés avec les ♀, cette identification restera douteuse ». (*An. Soc. Cient. Arg.*, 1933, **116**: 116-117).

En la colección de la Fundación Miguel Lillo (Tucumán) hay dos especies distintas, representadas exclusivamente por ♀. Una de las especies (una sola hembra alada, n° 2020, Trancas, provincia de Tucumán, col. R. Golbach, febrero 1947) corresponde bien a la descripción original de *O. bruchi* Sants. Otra especie es evidentemente nueva: *O. stenopterus* n. sp.

***Oligomyrmex stenopterus* n. sp.**

Descripción. — *Hembra*. Largo 5-5,2 mm.

Color bastante uniforme amarillo un poco pardusco, salvo la cabeza, que es un poco más oscura.

Escultura: Cabeza con un sistema de estrías finas (mucho más finas que en *O. bruchi*), longitudinales y casi paralelas sobre el frente en el espacio limitado por las aristas frontales y su proclípeo, área frontal depresa y su prolongación hacia atrás en las zonas laterales fuera de las aristas frontales. Parte mediana del clípeo, área frontal dipresa y su prolongación hacia atrás en forma de un surco mediano longitudinal corto, que apenas alcanza el nivel de los ojos; mandíbulas, escapos y funículos son lisos y lustrosos. Tórax en general liso y lustroso. Mesonoto entre los surcos parapsidales con algunas estrías longitudinales muy finas y bastante irregulares. Peciolo, postpeciolo y abdomen lisos y lustrosos.

Pilosidad: Una pilosidad erecta bastante larga pero fina y rara sobre todo el cuerpo excepto extremidades, siendo un poco más abundante sobre la cabeza y abdomen que sobre el tórax. Escapos, funículos y patas con una pubescencia finísima casi apretada apenas perceptible bajo el aumento de 30.