

Cabeza en general (vista frontal) casi rectangular, por aproximadamente  $1/5$  más larga que ancha (como en *O. bruchi*) con los costados un poco convexos, ángulos occipitales muy redondeados y el margen occipital escotado (menos que en *O. bruchi*). En el medio de la cara occipital de la cabeza se ve una impresión longitudinal de poca profundidad que alcanza los ocelos posteriores. Los ocelos son relativamente poco distantes entre sí de modo, que la distancia entre los ocelos posteriores es mucho menor en comparación con la distancia entre cada uno de los ocelos posteriores y el costado de la cabeza correspondiente. Los ojos son situados un poco antes de la mitad de los costados, ocupando un poco menos de  $1/4$  de su largo, son muy convexos, saliendo fuera de los contornos de la cabeza.

Mandíbulas fuertes, arqueadas y denticuladas como en *O. bruchi*. Clípeo con el margen anterior redondeado (sin escotadura mediana propia para *O. bruchi*); tiene la parte mediana levantada y subcarenada lateralmente. Aristas frontales divergentes hacia atrás, son cortas alcanzando apenas el nivel de los extremos anteriores de los ojos.

Escapos antenales cortos, apenas alcanzan el límite del tercio posterior de la cabeza, tienen la mitad basal arqueada y bastante fina y la parte apical dilatada con el mayor espesor en su extremo. Funiculos se componen de 8 artículos, de los cuales el primero es tan o aun un poco más largo, que los cuatro siguientes; los artículos 2-5 son mucho más espesos que largos, especialmente el segundo y el tercero; artículo sexto es tan largo como los dos anteriores. Los dos últimos artículos forman una maza, bien separada del resto del funículo y tan larga como todos los artículos anteriores juntos; además es mucho más espesa (casi doble); el último artículo es  $2\frac{1}{2}$  veces más largo que el penúltimo.

Tórax (vista dorsal) es mucho más angosto que la cabeza. Mesonoto y escutelo visto de perfil forman una línea continua convexa. Mesonoto sin surco mediano longitudinal, que es bien distinto en *O. bruchi* y con los surcos parapsidales menos largos y menos divergentes que en la última especie (*Santschi* no menciona estos caracteres en su descripción de *O. bruchi*). Epinoto con la cara basal muy corta (mucho más corta que la declive), que ocupa el plano más bajo en comparación con el mesonoto-escutelo (vista lateral).

Pecíolo (vista dorsal) de forma trapezoidal, con el ancho máximo en su tercio posterior y con el pedúnculo anterior muy estrecho y