

bién cerca del límite este de la provincia de Tucumán), La Rioja, San Luis, Neuquén, Río Negro.

El subgénero *Araucomyrmex* es común para las faunas de la Argentina y de Chile. En la República Argentina ha sido señalado en las provincias y territorios de La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. *D. (Araucomyrmex) tener* participa en la composición de la fauna de la Cordillera, subiendo hasta las alturas mayores de 4000 metros (Cumbre en la provincia de Mendoza). Como ya ha observado el Dr. A. Gallardo las obreras de esta especie no corren aisladas, como es característico para las cazadoras más avanzadas, sino forman hileras ralas, corriendo en la misma dirección a una distancia de 30-40 metros de su nido. En las partes más húmedas y boscosas cerca de la frontera argentino-chilena la especie típica está reemplazada por otra forma de tamaño menor y de color más oscuro, que vive en los claros naturales o artificiales. Puede ser que es *D. tener goetschi* Menozzi (no tengo la descripción original a mi disposición).

Otra especie, *D. (Araucomyrmex) richteri* según mis observaciones en el noroeste de la Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut) vive en la zona semiárida y su área de dispersión, en parte, coincide con el área de *D. tener*, particularmente en la zona de los bosques de *Libocedrus* (San Martín de los Andes, Bariloche, etc.). Por eso, así como por la falta completa de las formas transitorias y diferencias morfológicas apreciables (en general, el género *Dorymyrmex* es pobre en caracteres plásticos y los que existen son muy variables, por lo menos en algunas especies) considero *D. richteri* como una especie bien distinta.

El subgénero *Ammomyrma* es esencialmente un subgénero argentino. La única excepción representa *D. minutus* Em. que ha sido descrita de Chillán (Chile) y después fué encontrada en la Argentina (Chubut, Santa Cruz, prov. de Mendoza, — ver A. Gallardo, *Physis*, 1918 (nº 16), pp. 29-30). En su monografía 9. Gallardo (1916, p. 43) escribe lo siguiente: « parece a primera vista un pequeño *D. pyramicus* Rog. por la forma del corselete pero se acerca más a *D. tener* por las ammoquetas y la forma de los palpos ». Puede ser que esta especie realmente pertenezca al subgénero *Araucomyrmex*. El hallazgo de hembras aladas únicamente podría aclarar el asunto.

Excepto *D. minutus*, todas las otras especies han sido señaladas hasta la fecha solamente en la República Argentina. Sin embargo