

mientras *M. punctifrons* y *M. rastrata* son bastante variables de tamaño. Con respecto a otras 4 especies no se puede decir nada, debido al material muy escaso en los casos de *M. bruchi*, *mandibularis* y *daguerrei* (no sabemos cuántos ejemplares representan la especie *vezenyi*).

Martia inquilina y *minuta* pueden ser relacionadas únicamente con *M. vezenyi*. Las tres carecen de la sutura mesoepinotal. *Martia vezenyi* se caracteriza por el promesonoto bordeado delante y lateralmente, que tiene el borde anterior arqueado y hombros salientes (epaulé); además, el epinoto es arrugado transversalmente. *Martia inquilina* tiene el promesonoto no bordeado, carece de hombros (tubérculos humerales), su epinoto es muy lustroso y casi liso con una rugosidad apenas perceptible. Entonces, es una especie bien distinta. *Martia minuta* tiene el promesonoto no bordeado en forma distinta, pequeños, apenas visibles tubérculos humerales y epinoto arrugado transversalmente en forma bien distinta. Su tamaño es un poco inferior en comparación con él de *Martia vezenyi*. Puede ser una especie distinta o una subespecie de *Martia vezenyi*. Por eso la describimos *ad interim* hasta que se haya aclarado la biología y morfología de *M. vezenyi*.

Obreras. — Los caracteres diferenciales de las cuatro especies argentinas se puede ver en la clave siguiente.

1. — Tamaño mayor de 2 mm. Cabeza estriada a lo largo 2
 — Tamaño menor de 2 mm. Cabeza no estriada a lo largo 3
2. — Largo 2,2 mm. Color negro. Tórax a veces pardusco. Extremidades más o menos claras. Cabeza con una estriación longitudinal fina; los intervalos mates con los puntos esparcidos. Epinoto con las estrias transversales sobre su cara basal. Meso- y metasterno estriados a lo largo

Martia daguerrei Sant.

 — Largo 2,1 mm. Color rojo amarillento; partes del epinoto y del abdomen de color pardo; extremo del abdomen amarillo. Cabeza estriada a lo largo epinoto arrugado transversalmente *Martia bruchi* Sant.
3. — Largo 1,9-2 mm. Color como en *M. bruchi*. Epinoto sin arrugas transversales bien distintas. Mandíbulas relativamente largas con el margen masticatorio oblicuo y un diente apical fuerte. Postpeciólo muy ancho (su escama vista de arriba es casi 4 veces más ancha que larga). Pronoto lateralmente sin tubérculos. Ojos relativamente grandes, ocupan casi $\frac{1}{3}$ parte de los costados de la cabeza *Martia inquilina* n.sp.
 (Tucumán, jardín de la Fundación Miguel Lillo, lotes 111 y 1832 (11 obreras)).
 — Largo 1,7-1,8 mm. Color como en la especie precedente, un poco más claro. Mandíbulas relativamente cortas con el margen masticatorio no oblicuo. Epinoto con arrugas transversales bien distintas. Postpeciólo un poco me-