

ANALES DEL MUSEO NAHUEL HUAPÍ

Pogonomyrmex carbonarius Mayr

- Cabeza y tórax con algunas manchas rojas o rojizas variables. San Martín de los Andes, zona de ciprés.

Pogonomyrmex carbonarius sanmartini Kusnezov

- 11° — La base del primer tergito abdominal o este tergito en total con las estrías longitudinales muy finas y muy densas, teniendo por eso un aspecto sedoso. Color dominante rojo, variable. Largo de la obrera 5,5-7 mm. Zona de *Araucaria* y de la “estepa” con *Mulinum*.

Pogonomyrmex variabilis Santschi

- El primer tergito abdominal liso y lustroso. Color dominante negro con la cabeza roja. Zona de ciprés (*Libocedrus*), en los territorios de Río Negro y Chubut.

Pogonomyrmex vermiculatus chubutensis Emery

- 12° — Obrera pequeña (largo del cuerpo 2-2,6 mm.), de color negro con distinto reflejo azul metálico. Especie terrícola, que pertenece esencialmente a la zona árida fuera de los Parques Nacionales. Ha sido señalada en Quila-Quina sobre la orilla del Lago Lácar.

Forelius chalybaeus Emery

- Color rojo o negro sin ningún reflejo metálico. Obrera y hembra con un psamóforo bien desarrollado debajo de la cabeza. Ala anterior de la hembra con dos celdas cubitales cerradas y la celda discoidal, la del macho con la nervadura muy reducida (gran dimorfismo sexual).

Araucomyrmex Gallardo 13

- 13° — Color negro uniforme (obrero, hembra, macho). Largo del cuerpo en la obrera 2,8-4,2 mm., en hembra 7-8 mm., en macho 3,5-3,5 mm. Zona árida de la Patagonia y de la parte marginal de la zona boscosa.

Araucomyrmex richteri Forel

- Color dominante rojo 14

- 14° — Tamaño mayor: largo del cuerpo de la obrera, 3,5-4,5 mm., hembra hasta 8,5 mm., macho hasta 4,5 mm. Color de la obrera, rojo vivo. Mandíbulas, antenas y patas, oscuras. Abdomen negro. Viven en el suelo y bajo piedras. Corren rápidamente, siendo las hormigas cazadoras que persiguen su presa corriendo a gran velocidad. Zonas de *Araucaria* y de ciprés (*Libocedrus*).