

un poco escotado; es más estrecha (vista frontal) inmediatamente antes de las inserciones antenales.

Clípeo con margen anterior relativamente poco saliente y escotadura mediana bien neta sobre su margen anterior limitado lateralmente por dos dientes fuertes. De estos dientes parten las carenas longitudinales del clípeo distintamente convergentes sobre el clípeo mismo y casi paralelas sobre el frente entre alas inserciones antenales. Estas carenas apenas alcanzan la mitad de la distancia entre el margen anterior del clípeo y el ocelo inferior. El espacio entre estas carenas y más allá hacia el vértice representa una depresión mediana longitudinal, que por poco no alcanza el ocelo inferior (este carácter es variable). Aristas frontales cortas, algo divergentes hacia atrás y poco levantadas sobre el plano del frente. Mandíbulas con margen exterior fuertemente arqueado, margen masticatorio relativamente corto, oblicuo y armado de 3-4 fuertes dientes. Ojos chatos, ovales, situados sobre los costados mismos de la cabeza en la mitad anterior de los costados a una distancia de las inserciones mandibulares casi igual a su diámetro; ocupan aproximadamente 1/4 de los costados. Escapos arqueados en su mitad proximal en forma muy regular, son un poco más gruesos cerca de su ápice; alcanzan, o alcanzan casi el margen occipital de la cabeza. Funiculo se compone de 10 artículos: el primero es más largo que los dos siguientes juntos, los artículos 2 y 3 casi tan largos como gruesos, los art. 4-8 un poco más largo que gruesos. Los dos últimos forman una maza bien separada del resto y poco menos larga que el resto del funículo. Tórax mucho más estrecho que la cabeza (vista dorsal, fig. 1), relativamente corto y casi tan ancho como alto. Todas las suturas que separan los escleritos toracales son bien netos. Escutelo muy variable, a veces bien convexo, o más o menos chato. Epinoto con dos dientes simétricos fuertes romos en su ápice, dirigidos lateralmente, hacia atrás y hacia arriba. La cara basal del epinoto muy inclinada hacia atrás, tiene una depresión en su parte posterior y forma una transición suave hacia la cara declive casi vertical.

Peciolo con pedúnculo muy corto, armado por debajo por un fuerte diente dirigido hacia adelante y hacia abajo (fig. 2). El nudo del peciolo forma una lámina transversal bastante gruesa, cuya cara anterior es francamente convexa y la posterior cóncava. Postpeciolo aun más ancho que el peciolo y poco más ancho que el tórax (vista dorsal, fig. 1); visto de perfil es tan alto como el peciolo y mucho más redondeado. Patas relativamente cortas y fuertes, siendo los fémures poco más largos que los escapos antenales. Tanto fémures como tibias ensanchados en su parte distal. Abdomen de 4 segmentos visibles.

Soldado. Largo 2,6-3 mm. Mismo color como en la hembra, algo menos oscuro, con manchas poco aparentes sobre el frente y el noto del tórax. Escapos, funículos y abdomen siempre más oscuros que el resto del cuerpo.