


*Pilosidad esencialmente del mismo tipo que en la hembra, así como la pubescencia. Liso y lustroso excepto las estrías finísimas longitudinales al lado de las aristas frontales y sobre la parte apical de las mandíbulas.*

*Cabeza, vista frontal de contornos rectangulares, poco más larga que ancha, costados poco convexos, ángulos occipitales menos redondeados que en la hembra y leve escotadura muy neta sobre el margen occipital. Clípeo con una escotadura mediana profunda sobre su margen anterior. Emitada lateralmente por ángulos salientes. Carenas del clípeo como en la hembra. Mandíbulas del tipo de la hembra; margen masticatorio relati-*



*Synsolonopsis cyregia* Kusnezov

Fig. 1. — Hembra, dorsal.

Fig. 2. — Hembra, lateral.

*vamente corto, un poco ablicuo, armado de tres dientes muy romos. Ojos pequeños, chatos, colocados en la mitad anterior de los costados de la cabeza a una distancia de las inserciones mandibulares superior a su diámetro; ocupan aproximadamente 1/6 de los costados. Depresión mediana longitudinal del frente que parte del clípeo, alcanza solamente la mitad de la distancia entre el margen anterior del clípeo y margen occipital de la cabeza. Escapos relativamente cortos (más cortos que en la hembra)*