

del pronoto un poco salientes (casi no se los ven en el soldado), por los tubérculos epinotales aun más reducidos y el diente inferior del pecíolo muy pequeño. Los escapos son más largos que en el soldado y en las obreras pequeñas casi alcanzan el margen occipital de la cabeza (relativamente son menos largos que en la hembra).

Holotipo ♀, ergatotipo (obrero) y stratotipo (soldados) de Tafí del Valle ex lote 1298.

Material examinado: un solo lote n° 1298, Tafí del Valle, prov. de Tucumán, altura aproximadamente 2500 metros sobre el nivel del mar; 356 obreras, 18 soldados y 7 hembras desaladas fueron hallados en el suelo en el bosque de aliso (*Alnus jurrullensis*), donde la especie vive en ambiente bastante húmedo al lado de *Pheidole carapunco* Kusnezov e *Iridomyrmex* sp.




Fig. 5. — *Synsolenopsis photophila* Santschi, obrera. Según Santschi, *Rev. Suisse Zool.*, 1923, 50: 25.

***Synsolenopsis eximia* nov. sp.**

Obrera. Largo 1,3-1,5 mm. Color del tórax, pecíolo y postpecíolo castaño claro amarillento, cabeza un poco más oscura sobre el mismo fondo castaño; escapos, artículos 1-7 del funículo y patas de color amarillo sucio, aun más claro; abdomen y maza funicular castaño muy oscuro. Pilosidad erecta u oblicua muy rara, un poco más abundante sobre el abdomen. Pubescencia semiapretada finísima rara sobre todo el cuerpo, relativamente más abundante sobre las antenas. Escultura. Abdomen y extremidades lisos y lustrosos. Cabeza variable, o completamente lisa y lustrosa o con una escultura extremadamente fina y en este caso semilustrosa. Tórax, pecíolo y postpecíolo (el último en menor grado) casi opacos debido a la reticulación fina, la cual se combina con la estriación finísima longitudinal sobre el promesonoto. Nudo del postpecíolo a veces en parte liso. Cabeza más larga que ancha con contornos ovalados, costados un poco convexos, ángulos occipitales redondeados y margen occipital recto, no escotado y el ancho mayor aproximadamente en el nivel de la mitad de los costados. Los ojos bastante grandes, muy convexos, reniformes y oblicuos ocupan casi 1/4 de los costados y están colocados en la mitad anterior de los costados, siendo la distancia de las inserciones mandibulares, inferior a su diámetro máximo. Mandíbulas bien curvadas con margen masticatorio relativamente corto, oblicuo y armado de un diente apical y de 1-2 dientes