

más, muy romas y poco salientes. Clípeo con margen anterior saliente: su parte mediana con escotadura limitada lateralmente por dos dientes, de los cuales parten las carenas longitudinales, casi exactamente paralelas entre sí, sobrepasando éstas un poco el nivel de las inserciones antenales. Las aristas frontales poco divergentes hacia atrás alcanzan el nivel superior de los ojos. Escapos poco curvados en su mitad proximal, cortos y no alcanzan el margen occipital de la cabeza por 2-3 veces de su espesor apical. Funículos compuestos de 9 artículos, siendo el primero tan largo como los arts. 2-4 juntos, los arts. 2-7 muy cortos, casi dos veces más gruesos que largos y en conjunto apenas tan largos o menos largos que el último artículo de la maza; la maza de dos artículos está muy bien separada del resto del funículo, siendo por lo menos 3 veces más gruesa que los arts. 2-7. Pronoto con rebordes anterior y laterales bastante altos. Promesonoto convexo. Sutura mesoepinotal bien distinta y fuertemente impresa. Cara basal del epinoto levantada bruscamente en su parte anterior sobre la sutura mesoepinotal, inclinada después en forma regular hacia atrás, bordeada lateralmente en su mitad posterior por las crestas levantadas y unidas con los dentículos epinotales, cóncava entre éstos; es más larga que la cara declive. Tubérculos o dentículos epinotales son bien distintos y dirigidos hacia arriba. Dos finas crestas parten de estos tubérculos limitando lateralmente la cara declive del epinoto. Pedúnculo del pecíolo corto; nudo visto de perfil en forma de cono obtuso. Postpecíolo casi tan ancho como el pecíolo, siendo su nudo redondeado de perfil. Patas cortas con los fémures ensanchados.

Ergatotipo (obrero) del Puente Uriburu, Formosa (Argentina) ex lote 2600.

Material examinado: nº 2411, Puente Uriburu, Formosa, una obrera; nº 2600, Resistencia, Chaco, seis obreras.

CLAVE PARA LAS ESPECIES DE SYNSOLEENOPSIS FOREL

1. Soldado largo 2,8 mm, obrera 1,8 mm. Color negro o negro parduzco. Apéndices castaños, fémures más oscuros. Mesopleuras, epinoto, caras laterales y posteriores de los nudos del pecíolo y postpecíolo reticulado-puntuados. Pronoto y muy a menudo mesonoto con estrias longitudinales más o menos finas. Epinoto con ángulos dentados. Pecíolo con nudo redondeado. Artículos 2-7 del funículo más gruesos que largos. Villaguay, Entre Ríos *S. photophila* Santschi
- Otros caracteres. Escultura reducida o color del cuerpo más o menos claro 2
2. Color más o menos claro, castaño o amarillento. Mandíbulas lisas y lustrosas o con pocas estrias en su mitad apical. Margen masticatorio de las mandíbulas oblicuo .. 3
- Hembra. Largo 3,9-4,4 mm. Color negro con patas y antenas pardas; mandíbulas, articulaciones y aristas frontales rojo amarillento. Mandíbulas subopacas y arrugadas, con margen masticatorio recto, no oblicuo. Canals, Córdoba ... *S. bruchi* Forel
3. Obrera. Maza del funículo aproximadamente tres veces más gruesa y más larga que el resto del funículo; artículos 2-7 más gruesos que largos. Ojos reniformes. Tórax-