

NUEVAS ESPECIES DE HORMIGAS
(HYMENOPTERA, FORMICIDAE)

por Nicolás Kusnezov¹

Los tipos de las especies descritas en adelante se encuentran en la colección mirmecológica del Instituto Miguel Lillo. Las claves agregadas en cada caso permiten ubicar cada una de las especies nuevas dentro del género correspondiente. Estas claves complementan las "CLAVES PARA LA IDENTIFICACION DE LAS HORMIGAS DE LA FAUNA ARGENTINA," publicadas en la Revista IDIA (1956, n° 104-105), representando hasta cierto grado la continuación de estas últimas. Las claves se refieren esencialmente a las partes extratropicales de Sud América y sirven para identificar a las hormigas de la Argentina, Uruguay y Chile.

Cyphomyrmex nemei n. sp.

Obraera. Largo 2-2,2 mm. Color pardo amarillento bastante uniforme y solamente la cabeza es un poco más oscura. Tegumento opaco debido a la escultura secundaria finísima. Pubescencia finísima apretada sobre todo el cuerpo. Pilosidad fina y rala, oblicua o erecta sobre el abdomen y la parte ventral de la cabeza (como en *Cyphomyrmex quebradae* Kusnezov). Cabeza por lo general como en *quebradae*; su margen occipital tiene la emarginadura doble, es decir, la emarginadura principal a todo lo ancho del margen occipital entre los ángulos occipitales y otra más profunda en el medio. Escrobas antenales divergentes hacia atrás. Aristas frontales como en *quebradae* poco dilatadas sobre las articulaciones antenales. Escapos antenales apenas alcanzan los ángulos occipitales de la cabeza. Funiculo con una maza de dos artejos, siendo el último mucho más largo que el penúltimo (más de tres veces). Mandíbulas largas con 6-8 dientes.

Pronoto solamente con dos tubérculos laterales, sin un tubérculo mediano. Mesonoto lateralmente no bordeado y con la parte mediana convexa. Epinoto sin tubérculos, de perfil redondeado, siendo la cara basal mucho más corta que la declive. Peciolo visto de arriba ovalado, dos veces más ancho que largo, con los costados convexos, margen anterior recto y la lámina postero-superior muy reducida. Postpeciolo aún más ancho que el peciolo,

1) Instituto Miguel Lillo, Tucumán (Rca. Argentina).