

suboval, con los contornos postero-superiores menos sinuados en comparación con *quebradae* y el posterior escotado.

*Hembra.* Largo 2,8-3 mm. Por lo general parecida a la hembra de *C. quebradae*. Color pardo-rojizo, bastante claro, excepto la parte mediana de la cabeza que es más oscura. Escultura principal del tegumento (tubérculos y otras protuberancias) del mismo tipo, aunque menos acusada. El margen occipital de la cabeza con la escotadura doble bien acusada como en la obrera. Escrobas antenales divergentes hacia atrás formando detrás los ángulos occipitales de la cabeza bien salientes. Aristas frontales relativamente poco dilatadas sobre las articulaciones antenales. Escapos antenales apenas alcanzan los ángulos occipitales de la cabeza. Funiculo con una maza de dos artejos distales, bien delimitada; el último artejo es tres veces más largo que el penúltimo. Ojos bien convexos, ocupan aproximadamente una sexta parte de los costados de la cabeza y están colocados un poco antes del medio de los costados. Margen interior de las mandíbulas largo, provisto de ocho dientes.

Ala anterior con la celda cubital mucho más corta que la radial (aproximadamente 60 % del largo de esta última); la nervadura longitudinal *M* se separa de *Rs-M* un poco antes de la nervadura transversal *r* (como en *quebradae*); pterostigma ausente.

Cara basal del epinoto muy corta y casi tan inclinada como la cara declive, siendo separada de la última por dos tubérculos romos. Peciolo transversal, por lo menos dos veces más ancho que largo, subcuadrado, con los costados convergentes hacia atrás en su parte posterior. Postpeciolo casi tres veces más ancho que largo y mucho más ancho que el peciolo, con los márgenes antero-laterales convexos y los postero-laterales escotados.

*Macho.* Largo 2,3-2,6 mm. Color pardo oscuro uniforme, solamente con las articulaciones y en parte extremidades menos oscuras. Contornos de la cabeza como en *Cyphomyrmex quebradae* (ver: Kusnezov, Acta Zool. Lilloana, 8, lámina 2, fig. 11) con tres ocelos más grandes y más salientes.

Aristas frontales son apenas divergentes hacia atrás y relativamente cortas, terminándose a un nivel, correspondiente a la posición del ocelo anterior, más cerca de los costados de la cabeza, que del ocelo, y limitando las escrobas antenales bien distintas. Escapos antenales largos, sobrepasan el margen posterior de la cabeza por dos veces de su espesor distal. Funiculo con una maza relativamente poco acusada de tres artejos distales, de los cuales el último es dos veces más largo que el penúltimo.

Pronoto con dos dientes laterales salientes y dirigidos lateralmente. Mesonoto con dos impresiones divergentes hacia adelante, correspondientes a los surcos de Mayr. Cara basal del epinoto