

margen posterior de la cabeza. Tórax con el dorso aplanado; solamente el pronoto tiene dos tubérculos apenas salientes. Epinoto anguloso en el límite entre las caras basal y la declive. Postpeciolo ovalado, transversal, casi tres veces más ancho que largo. Largo 2,5 mm. (?). Color pardo rojizo; patas y antenas rojizo (de acuerdo a la descripción original).

Cyphomyrmex bruchi Santschi 1917

- Escapos largos, sobrepasan el margen posterior de la cabeza 6
- 6. Postpeciolo visto de arriba subcuadrado, no más de 1,2-1,4 veces más ancho que largo. Largo 2,1-2,3 mm. Tórax, peciolo y patas pardo-rojizo; el resto más oscuro, hasta negro parduzco.

Cyphomyrmex cochunae Kusnezov 1949

(*C. rimosus cochunae* Kusnezov).

- Postpeciolo visto de arriba casi 2 veces más ancho que largo. Color ordinariamente pardo oscuro hasta casi negro.

Cyphomyrmex rimosus Spinola 1851.

A. Epinoto con tubérculos muy reducidos.

C. rimosus fuscus Emery 1922.

AA. Epinoto con tubérculos bien distintos.

B. Dorso del tórax con tubérculos bien desarrollados.

C. rimosus transversus Emery 1894.

BB. Dorso del tórax con los tubérculos menos desarrollados.

C. rimosus pencosensis Forel 1914.

- 7. Escapos cortos, apenas alcanzan el margen posterior de la cabeza.

Postpeciolo por lo menos dos veces más ancho que largo 8

- Escapos más largos, ordinariamente sobrepasan el margen posterior de la cabeza 9

- 8. Mesonoto con la parte mediana plana, bordeada lateralmente por dos (de cada lado) tubérculos de perfil redondeado.

Pronoto con tres tubérculos. Color amarillo sucio uniforme. Largo 1,8-2 mm.

Cyphomyrmex quebradae Kusnezov 1949.