

Ectatomma regis n. sp.*Ectatomma quadridens* F.

Clipeo con 12 (más o menos) estrías longitudinales, las cuales no son iguales entre sí y la mediana un poco más gruesa que otras.

Clipeo con unas 20 estrías longitudinales, muy finas e iguales entre sí.

Margen posterior de la cabeza un poco escotado.

Margen posterior de la cabeza casi recto.

Angulos occipitales de la cabeza bien distintos.

Angulos occipitales de la cabeza redondeados.

Ojos distan del margen posterior de la cabeza por un poco menos de su diámetro.

Ojos distan del margen posterior de la cabeza por más de su diámetro.

Mesonoto con estrías transversales bastante acusadas.

Mesonoto con las estrías longitudinales muy finas y convergentes hacia atrás en la mitad posterior.

Cabeza y el dorso del tórax rojizo oscuro; el resto casi negro.

Color oscuro uniforme, casi negro, a veces en parte rojizo.

Holotipo: obrera, n° 3716, Reserva Nacional Estancia El Rey, Prov. Salta, Argentina.

Paratipos: n° 151, valle del Río Sali, 40 km. hacia el norte de Tucumán; n° 6185, Ruta 9, km. 1335, prov. Tucumán.

Clave para las especies de *Ectatomma* s. str. (sin subgéneros *Parectatomma* y *Gnamptogenys*) en la parte extratropical de Sud América.

1. *Obrera*. Largo del cuerpo 11-13 mm. Color rojo de ladrillo, especialmente en los insectos vivientes. Frente en el medio con dos tubérculos agudos, dirigidos hacia adelante. Pronoto con dos tubérculos humerales salientes y un tubérculo mediano romo. Dos primeros segmentos del abdomen opacos, con una escultura densa y finísima, reticulada o coriacea. Especie mesófila, común en el Litoral Argentino y Uruguay.

Ectatomma opaciventre Roger

- *Obrera*. Tamaño menor (largo total hasta 10 mm.); color oscuro. 2
- 2. *Obrera*. Largo 6,5-7,5 mm.; monomorfa. Pronoto redondeado, sin tubérculos salientes. Frente de la cabeza estriado a lo largo en el espacio entre las aristas frontales y arrugado-re-