

La siguiente clave permite identificar las especies sudamericanas (obreras).

1. Largo total 2,3-2,8 mm. Color variable, ordinariamente pardo amarillento con el abdómen oscuro.
Ojos muy grandes y convexos, salen afuera de los contornos de la cabeza.

Forelius macrops n. sp.

— Otros caracteres. Ojos menos grandes y menos convexos. 2

2. Largo 1,7-2,5 mm. Color muy variable dentro de una misma colonia de acuerdo con el tamaño, desde amarillo rojizo (excepto segmentos abdominales a partir del tercero y el ápice del funículo) hasta pardo negruzco con los escapos, tibias y base del abdómen menos oscuro. Raro.

Forelius instabilis Santschi 1919

— *Color no, o apenas variable* ————— 3.

3. Largo 2-2,3 mm. Color pardo rojizo o amarillo rojizo. Escapos antenales apenas sobrepasan el margen posterior de la cabeza. Raro.

Forelius breviscapus Forel 1913

— Escapos antenales más largos; - sobrepasan bien el margen posterior de la cabeza. 4

4. Tamaño pequeño (largo 1,8-2,1 mm.). Sutura mesoepinotal borrada. 5

— Tamaño mayor. Sutura mesoepinotal distinta, a veces bien acusada (por lo general el desarrollo de la sutura mesoepinotal va a la par con el aumento de tamaño). 6

5. Largo 1,5-2 mm. Color pardo oscuro con la base del abdómen de color blanco. Norte de la Argentina; más común en la zona árida.

Forelius albiventris Forel 1912

— Largo 1,7-2 mm. Color pardo uniforme, a veces con un debil reflejo metálico. Argentina; zona árida y semiárida. Bastante raro.

Forelius minor Forel 1913

6. Color claro, amarillo o rojo, a veces en parte oscuro hasta negro. 7

— Color oscuro, azul metálico, a veces cabeza, tórax, extremidades y mandíbulas más claras de color rojizo. 9

7. Color rojo amarillento testáceo. Largo 3-4 mm. Margen pos-