

terior de la cabeza ligeramente escotado. Escapos sobrepasan el margen posterior de la cabeza por  $1\frac{1}{5}$  -  $1\frac{1}{4}$  de su largo. Noroeste de la Argentina y suroeste de Bolivia.

*Forelius rufus* Gallardo 1916

— Color dominante amarillo, a veces un poco rojizo. . . . . 8

8. Largo 2,3-3,7 mm. Color amarillo claro. Pubescencia apretada fina abundante.

Brasil sur, Uruguay, Paraguay, Chaco Boliviano, norte de la Argentina.

*Forelius brasiliensis* Forel 1908

— Largo 2,5-3,6 mm. Color amarillo, abdómen negro.

Norte de la Argentina, - especialmente en la zona semiárida.

*Forelius nigriventris* Forel 1912

9. Largo 2,4-3,5 mm. Color oscuro con esplendor metálico azul y con la cabeza, antenas, tibias y tarsos rojizos.

Raro, zona semiárida de la Argentina.

*Forelius rubriceps* Forel 1914.

— Cabeza y tórax de color azul metálico. . . . . 10

10. Tamaño variable y más pequeño (largo 2-3,3 mm.). Color negro con fuerte reflejo metálico azul, tendiente al verdoso, subopaco por punteado fino. Margen posterior de la cabeza no escotado. Sutura mesoepinotal poco acusada. Común en la zona árida de la Argentina.

*Forelius chalybaeus* Emery 1905

— Tamaño más grande (largo total 2,5-4 mm.). Margen posterior de la cabeza más o menos escotado. Sutura mesoepinotal bien distinta (mejor acusada en los ejemplares de tamaño mayor). . . . . 11

11. Color azul metálico uniforme. Escapos relativamente cortos, sobrepasan el margen posterior de la cabeza por 1-1,5 veces de su espesor distal. Sutura mesoepinotal bien acusada.

Forma de gran altura del noroeste de la Argentina.

*Forelius andinus* n. sp.

— Color del cuerpo azul metálico; mandíbulas amarillo rojizo; antenas, tarsos y articulaciones más o menos rojizos, tibias pardas con reflejo metálico. Escapos más largos; sobrepasan