


Postpetiolus von oben gesehen viel breiter als Petiolus. Dornen an den Enden der Mittel- und Hinterbeinschienen einfach, nadelförmig dünn. Mehr oder weniger ganzer Körper abstehend, oder nicht ganz anliegend behaart. Haare einfach, nicht abgestutzt oder gezähnt. Körper zumeist dicht und fein längsgerunzelt, nicht spiegelglatt, jedoch ziemlich glänzend.

*Doronomyrmex pacis* nov. spec.

♀ Fig. Größe: 3,9 mm; bei vorgestrecktem Kopf und ausgestrecktem Stielchen, inklusive Mandibeln 4,2 mm lang. Kopf 0,83 mm lang und 0,65 mm breit. Thorax 0,67 mm breit.

Färbung: dunkelbraunschwarz. Fühlerschaft zumeist, Fühlergeißel mit Ausnahme der Keule, Mandibeln, alle Beine exkl. Hüftglieder, ventrale Partien des Stielchens gelbbraunlich.

Skulptur: Mandibeln, mit Ausnahme der Haarpunkte glatt und glänzend. Der bis zum Vorderrand konvex gewölbte Clypeus vorn nur etwas fein punktiert, sonst außer den Haarpunkten glatt und glänzend. Keine Mittelfurche oder Kante. Hinterrand gerundet. Stirnfeld undeutlich umgrenzt und weniger skulptiert als Kopfvorderfront. Diese, mit Ausnahme eines schmalen, gleichfalls nicht scharf umrissenen Mittelstreifens, wie die Kopfseiten fein und dicht längsgerunzelt. Hinterhaupt fast ganz glatt und glänzend zwischen den Haarpunkten. Die ganze dorsale Medianpartie des Thorax, vom Pronotum bis zum Petiolus mehr oder weniger glatt und glänzend. Lateralwärts nimmt eine feine und dichte Längs-



*Doronomyrmex* n. g. *pacis* n. sp.