

Н. Н. Кузнецов - Угамский.

Материалы по мирмекологии Туркестана.

(С 15 рис.)

N. N. Kuznetzov-Ugamskij.

Beiträge zur Kenntnis der Myrmekologie von Turkestan.

(Mit 15 Fig.).

I. Род *Formica* L.

Ключ для определения туркестанских форм по ♀♂.

- | | |
|---|---|
| 1. Личной щиток с выемкой по середине переднего края . . . | 2 |
| Личной щиток без такой выемки; по переднему краю за-
кругленный или несколько выдающийся углом | 6 |
| 2. Крупный; длина тела рабочего 6 — 8 мм | 3 |
| <i>F. sanguinea</i> Latr. s. str. | |
| Более мелкий; длина тела рабочего 4,25 — 5,75 мм | 5 |
| 3. Заднеспинка широко закруглена в месте перехода гори-
зонтальной поверхности в покатую, без заметного угла между
ними (рис. 2) <i>F. sanguinea</i> Latr. var. <i>rotundata</i> nov. | |
| Заднеспинка в месте перехода горизонтальной поверхности
в покатую образует закругленный, но вполне ясный угол
(рис. 1 и 3). | 4 |
| 4. Тело и в особенности брюшко с густым и чрезвычайно
тонким прилегающим опушением, придающим всему телу неко-
торый шелковистый блеск. Размеры несколько меньшие, чем
у типа <i>F. sanguinea</i> Latr. var. <i>griseopubescens</i> nov. | |
| Опушение тела редкое . . . <i>F. sanguinea sanguinea</i> Latr. | |
| 5. Размеры более крупные: длина тела рабочего 4,6 —
5,75 мм. Лобная площадка блестящая, почти гладкая, с малень-
кими, лишь в микроскоп заметными поперечными вдавлениями.
. <i>F. sanguinea</i> Latr. <i>monticola</i> , subsp. nov. | |

Русск. Энтом. Обзор., XX, 1926.