

17. Грудь сверху с более или менее обильным отстоящим опушением	20
Верх груди с немногими или вовсе без отстоящих волосков	18
18. Горизонтальная поверхность заднеспинки (в профиль) слегка выпуклая, почти ровная. . . <i>F. rufibarbis rufibarbis</i> Fa br.	
Горизонтальная поверхность заднеспинки с легким, но хорошо заметным поперечным вдавлением	19
19. Более крупный: длина тела рабочего 5—6,5 мм.	
<i>F. rufibarbis montana</i> , subsp. nov.	
Более мелкий: длина тела рабочего 4,2—4,8 мм.	
<i>F. rufibarbis montana</i> var. <i>minor</i> nov.	
20. Более крупный: длина тела рабочего 5—7 мм.	
<i>F. rufibarbis subpilosa</i> Ruzsky.	
Мелкий: длина тела рабочего не превышает 4,5 мм.	
<i>F. rufibarbis litoralis</i> , subsp. nov.	

1. *Formica sanguinea sanguinea* Latr.—Распространение: окрестности озера Балхаш (Рузский, 1905); Хымсан; Чимкент (Кузнецов).

2. *F. sanguinea sanguinea* var. *rotundata* nov. (рис. 2).—Распространение: Орловка; горы в районе озера Бахман-Куль на Угаме; дол. Куяцды, прит. Джебоглы-Су; пос. Краснореченский; Абай; родник по тракту в 6 верст. западнее Пишпека; долина р. Машат (Кузнецов).

Unterscheidet sich vom Typus durch lichtere Köpferfärbung und andere Thoraxgestalt; Epinotum (Fig. 2) im Profil betrachtet gewöhnlich breit abgerundet, nicht eckig, oder wenn etwas eckig, ist die Mesoepinotaleinsenkung tiefer als beim Typus. Stirnfeld sehr fein, schwächer als beim Typus quergestrichelt. Anliegende Behaarung des Körpers sehr fein und spärlich. Die ganze Körperoberfläche seidig schimmernd.

3. *F. sanguinea sanguinea* var. *griseopubescens* nov.—Распространение: Кельте-Машат (Кузнецов).

Unterscheidet sich vom Typus durch dichte anliegende mikroskopische Behaarung des ganzen Körpers. Stirnfeld matt, sehr fein netzähnlich quergestrichelt. Epinotum wie bei Typus. Körperlänge 6—7 mm.

4. *F. sanguinea monticola*, subsp. nov. (рис. 3 и 4).—Распространение: долина р. Тургень; Большой Джаргыльчак.

Kleiner als die typische *F. sanguinea* (Körperlänge 4,6—5,75 mm). Stirnfeld glänzend, fast glatt, mit mikroskopischen queren punktförmigen Grübchen. Skulptur schwächer, als beim Typus. Anliegende Behaarung des Abdomens etwas spärlicher, als bei var. *griseopubescens*. Kopf und Thorax mit weniger dichter anliegender Behaarung. Abdomen schwach seidig schimmernd.

5. *F. sanguinea monticola* var. *minuta* nov. (рис. 5 и 6).—Распространение: Джаланаш (Кузнецов).

Körpergrösse kleiner (Länge 4,25—5,5 mm). Mesoepinotaleinsenkung schwächer als beim *F. sanguinea monticola*. Clypeus schwächer