

12. *F. fusca picea* Ny l. (syn: *F. gagates* Latr., Форель, 1903; *F. fusca gagates* Latr., Рузский, 1905). — Распространение: Тянь-Шань: Таласский Алатау на выс. около 3—4 тыс. м (Рузский, 1902); ущелье р. Карагалинки, 500—800 м (Караваев, 1912); Барскоун, Джолборсты, Джиты-огуз, верховья р. Тюп (Кузнецов); Джунгарский Алатау: верх. р. Усек, ок. 800 м, р. Ой-Саз, верх. р. Чинбулак, выше 1000 м (Рузский, 1905); Памиро-Алай: Лянгар, р. Гунт, Шугнан, р. Гунт, Ривак, Карагурум-Мазар, р. Гунт, Сардым, Заалайский хреб., Бахмир, 3000 м (Форель); Пшарт, озеро Кара-куль (Рузский, 1905).

13. *F. fusca* var. *pallipes* nov. — Распространение: горы к югу от Алма-Ата, дол. р. Асы в Заилийском Алатау (Кузнецов).

Wie typische *F. fusca*, unterscheidet sich aber durch viel lichter gefärbten Beinen: gelb oder seltener rödlich-gelb.

14. *F. rufibarbis* Fabr. (syn.: *F. cinerea* Майр 1877¹; *F. cinerea* var. *imitans* (Рузский 1902, 1905). — Распространение: низменности: Ташкент, Джизак, степь между Сыр-Дарьей и Ташкентом (Майр, 1877); Ташкент, Наманган (Рузский, 1905), Ташкент, Чимкент (Кузнецов); Тянь-Шань: Дуаны-тау, Пскем, Испай, Пскем-Узун-ачак, Кельте-машат, Казыкурт, верховья р. Кизыл-Ата, Карагату, Ак-Куз, Карагату, Кок-булак, Ак-Таш, восточные отроги Казыкурта, Куянды, прит. Джебоглы-су (Гомолицкий), Карапульский перевал, Каракол, Иссык-куль, бывш. монастырь, Джалиланаш, южный берег Иссык-куля от Тона до Барскоуна; Джухука, Кордон, путь Барскоун — Джолборсты; путь от пос. Сарыджас к оз. Бородобосун; дол. р. Текес выше Какпака, Баркара, дол. р. Каркары выше ярмарки, Орловка Пиштек у., 6 км к западу от Пиштека, пос. Успенский в Наманган. у. (Кузнецов). Джунгарский Алатау: Ой-Саз, верх. р. Чинбулак (Рузский 1905); Джаркент, Ак-арал, Джаркент. у., пос. Абакумовский (Архангельский); Памиро-Алай: Самарканд, Оббурден, Вазаминор, Ягнау, Пейшамбе, Ворух, Сох, Уч-курган, Ош, у перевала Така (Майр 1877); Иори, Обдурман, Урмит, Гульча, Гориф, Искандер-куль, Дамбурачи, Каракуль, Памир (Рузский, 1905); Спичев хутор (Караваев, 1916); Копетдаг: Багир (Кузнецов).

15. *F. rufibarbis subpilosa* Ruzskу. — Распространение: Казалинск, бер. Сыр-Дары, устье Сыр-Дары, Раим, Куван-Дарья, озеро Кара-Терень, 50 км от Казалинска (Рузский, 1902); Дарваз, Ванч, Рошан, дол. р. Гунт, Бартанг (Форель, 1903), станция Голодная Степь, окр. Нов. Маргелана (Рузский, 1905), почтовая станция Кара-Таш за Буамским ущельем, Буамское ущелье, Дуанытау (Кузнецов), Асхабад, Фирюза, Имам-Баба, Кушка, Андижан, ст. Сыр-Даргинская (Форель, 1910). Сравнительно большое количество относящихся к этой форме литературных указаний объясняется, пови-

¹ Синонимия на основании ознакомления с коллекцией А. И. Федченко, служившей материалом для работы Майра.