

димому, тем обстоятельством, что прежние авторы не отличали рассматриваемую ниже форму *F. rufibarbis subpilosa clara*, которая, как это сейчас выясняется, представляет собою типичную форму равнин, главным образом, центральной части Туркестана, заметно отличаясь от горной формы. Этую последнюю мы и склонны считать за настоящую *F. rufibarbis subpilosa*.

16. *F. rufibarbis subpilosa clara nova*. — Распространение: Самарканд, Чиназ, Джелалабад, Токмак, Канибадам, Наманган, Джалағаш, г. Туркестан, Джизак (Кузнецов).

Uebergangsform: Färbung von *F. rufibarbis clara*; abstehende Behaarung des Körpers wie bei *F. rufibarbis subpilosa*.

17. *F. rufibarbis clara* For. — Распространение: Казалинск и его окрестности (урочище Кара-Чингыл и Мий-Тюбек), устье реки Сыр-Дары, Раим, остров Барса-Кельмес (Рузский, 1902), р. Гунт, Сардыым, Ваан к югу от Хорога, Вахан, Рошан, Кала-п-Вамар, р. Бартанг, Назир, Дарваз, Таши-Курган, Кудара, вост. Бальджуан, Тавалинг, Гульча, Асхабад, Байрам-Али (Форель, 1903); Новый Маргелан; Таласский Алатау, Гориф, Гиссар, Дамбурачи, южный берег Балхаша и дол. р. Или, Чарджуй, нижи. Аму-Дарья (Рузский, 1905), Аксу-Күйтган, Кара-Су в 10 верстах южнее Сузака, лесничество Ак-Таш, Кельте-Машат, Чимган, Брич-Мулла, Угам, Богучанлык, Чимкент, дол. р. Калтар-Кумыш, дол. Польтау за Брич-Муллой, Пскем, Тепар, Чалдавар, Скобелев, Каранкульский перевал, Хумсан, Дуаны - Тау (Кузнецов).

Vorwiegend in der Tiefebene; ausnahmsweise auch im Gebirge.

18. *F. rufibarbis montana*, subsp. nov. (рис. 9, 10 и 11). — Распространение: Кизыл-Тал, Кельте-Машат, кишлак Пскем, Чимкент, Калтар-Кумыш, Карнак, Боролдай, Дуаны - тау, между ст. Бурное и Маймаком, Аулие-Ата (Кузнецов), Гунамбай (Лейн); Угам в 5 км выше Хумсана, Кара-Алма (Кузнецов); Джетысу: Чулпан - Ата, перевал Кизыл - кия, Большой Джаргылчак, Дженишке, пос. Краснореченский, Турайгыр, Барскоун (Кузнецов); Джаркент, пос. Абакумовский, пос. Царицынский, путь Кугалы до пос. Царицынский, Кара-Джут, Алмаатинск. уезд (П. П. Архангельский).

Unterscheidet sich vom Typus durch andere Thoraxgestalt: Basalfläche des Epinotium im Profil betrachtet eingedrückt<sup>1</sup> (Fig. 9 und 10). Körperfärbung dunkler. Abstehende Behaarung des Körpers stark reduziert. Gebirgsform; ausnahmsweise im Ebenen.

19. *F. rufibarbis montana clara nova*. — Распространение: Иб - Ата в Карагату, ущелье р. Икан-су, уроцище Долоното, Джелалабад (Кузнецов).

Eine Uebergangsform. Körperfärbung wie bei *F. rufibarbis clara*, aber Epinotum quereingedruckt, wie bei *F. rufibarbis montana*.

<sup>1)</sup> В отношении названного признака наш подвид сходен с описанной М. Д. Рузским с Алтая var. *katuniensis*, мне известной в натуре.