

20. *F. rufibarbis montana* var. *minor* nov. (рис. 12). — Распространение: Кумыш - Курган, бывш. монастырь на Иссык - куле, Каракол (Кузнецов).

Unterscheidet sich vom *F. rufibarbis montana* durch die kleinere Körpergrösse (Länge 4,2 — 4,8 mm). Thorax nackt; Kopf und Abdomen mit einzelnen abstehenden Haaren. Beinenbasis oft dunkel bräunlich, oder schwärzlich - braun.

21. *F. rufibarbis litoralis*, subsp. nov. (рис. 13 и 14). — Распространение: исключительно в бассейне Иссык - куля: поселок Рыбачий, Чоктал, Кок - Майнак, Джиты - огуз (Кашка - су), близ устья Мал. Джаргыльчака, урочище Чубарджан (Кузнецов). В изобилии встречается по всему побережью Иссык - куля, часто устраивая гнезда в сыпучем песчаном или щебнистом грунте прибрежной зоны.

Basalfläche des Epinotums flach, selten nur sehr schwach quer eingedrückt. Körperlänge kleiner (3,7 — 4,4 mm). Abstehende Behaarung des Körpers, wie bei *F. rufibarbis subpilosa*, ziemlich reich, besonders am Thoraxoberseite.

In vorliegender Arbeit werden 21 Ameisenformen aus Turkestan aufgezählt, darunter folgende als neue beschrieben:

Formica sanguinea var. *rotundata* (Gebirgsform, Tian-Shan-Gebirge); *F. sanguinea* var. *griseopubescens* (Vorgebirge des westlichen Tian - Shan); *F. sanguinea monticola*, subsp. nov. (im zentralen Tian-Shan; Gebirgsform); *F. sanguinea monticola* var. *minuta* (Zailijsky Alatau); *F. rufibarbis montana*, subsp. n. (Tian - Shan und benachbarte Ebenen); *F. rufibarbis montana* var. *minor* (sporadisch; Gebirge und Ebenen); *F. rufibarbis litoralis*, subsp. n. (Issyk-kul Becken).

Объяснение рисунков.

1. *Formica sanguinea* typica из-под Москвы; профиль груди. — 2. *F. sanguinea* var. *rotundata* nov., Орловка; профиль груди и головы. — 3. *F. sanguinea monticola*, subsp. n., Большой Джаргыльчак; профиль груди и головы. — 4. То же, голова. — 5. *F. sanguinea monticola* var. *minuta* nov., Джалаанаш; голова. — 6. То же, профиль груди. — 7. *F. exsecta exsecta*, Джукка; профиль груди. — 8. То же, голова. — 9. *F. rufibarbis montana*, subsp. n., Кельте-Машат; голова. — 10. То же, профиль груди. — 11. То же, Кизил-Тал; профиль груди. — 12. *F. rufibarbis montana* var. *minor* nov., Карасай; профиль груди и головы. — 13. *F. rufibarbis litoralis*, subsp. nov., посел. Рыбачий; профиль груди и головы. — 14. То же, Тон - Барскоуи, южный берег Иссык - куля. — 15. *F. rufibarbis* typica, Косино близ Москвы.

ЛИТЕРАТУРА.

Forel, A. Ежегодн. Зоол. Муз. Акад. Наук, VIII, 1903. — Karawajew, W. Horae Soc. Ent. Ross., XXXIX, 1910, pp. 1 — 72; Revue Russe Ent., XII, 1912, pp. 580 — 596; XVI, 1916, pp. 496 — 507. — Майр, Г. Путеш. Туркест. Федченко, XIV, 2, 1877. — Рузский, М. Изв. Турк. Отд. Русск. Геогр. Общ., III, 1902; Муравьи России, I, 1905.