

Die Ebenen und Vorgebirge Mittelasiens.

Turkmenistan: Molla-kara, die Wüste Kara-kum, Karabu-gas, Kasandshik, Merv, Kusehka, Repetek, Iolotanj. Utsch-ad-shi, Geok-tepe, Dort-kuju, Dshu-dshu-klu, Aschabad.

Uzbekistan: Baba-tau-Gebirge, Aj-bulak, (Tadshikistan), Hungersteppe.

Kasakstan: Umgegend von Aral-see, Eisenbahnstation Arys, Tamerlanovka, Jussup-chana zwischen Chodshekent und Tschingan im westlichen Tian-Sehan, Balyktschi im Karatau westlich von Suzak, zwischen Ali und Karnak n.-w. von Stadt Turkestan, Bahnstation Tartugaj.

*Messor barbarus aralocaspius* Ruzsky.

5. Epinotum mit kurzen aber deutlichen abgestumpften Zähnchen 6  
 Epinotum unbewehrt, höchstens sehr schwach höckerig 7  
 6. Thorax rötlich, höchstens nur die vordersten Coxen dunkler gefärbt. Hinterleib oben mit feinen, spärlichen abstehenden Härchen bekleidet. Körperlänge 4—9 Mill.

Ueber die Ebenen und Vorgebirge verbreitet. Nach ostwärts bis Kurdaj und Poststation Otar, zwischen Frunze (ehem. Pisch-pek und Alma-ata (Vernyj).

Turkmenistan: Merv, Duschak, Bajram-ali, Karabata, Babadurmaz. Utsch-adshi, Bagir, Aschabad, Geok-tepe, Ginsburg (ehem. Kaachka).

Uzbekistan: Namangan, Osch, Andishan, Karaktschi-kum, Machram, Kani-badam, Samarkand, Katta-kurgan, Zaamin, Dshizak, Tschkent.

Kasakstan: Britsch-mulla, Dshilga, Kengrak, Kasykurt, Iskander, Tul-kubas, Ikan, Tschit-aryk, Tschimkent, Stadt Turkestan, Belovodskoje, Bugun, Akmulla, Kizil-kul See, Kornilovka, Suzak, Tschulak-kurgan, Kumysch-kurgan, Aksu-kujgan, Kara-su südlich von Suzak, Ali distr, Turkestan, Tartugaj, Badshi-bel, Balyktschi, Tschuschka-bulak, Bala-bugun, Ikan-su, Karatschik, Toskoul-ata, Turt-tehij, Poststation Otar, Kurdaj, Tschaldavar, Frunze, zwischen Frunze und Novotroitkoje.

*Messor barbarus meridionalis* var. *denticulatus* nov.

(Syn. *Messor barbarus meridionalis* auct. — partim.)

Hinterleib oben unbehaart. Basalfläche des Epinotums stärker gewölbt, als bei der vorhergehenden Form. Körperfärbung etwas heller.

Die Ebenen Turkmenistans: Aschabad, Utsch-adshi, Bagir.

*Messor barbarus meridionalis* var. *glabriusculus* nov.

7. Thorax ganz rötlich höchstens die Coxen dunkler gefärbt. Körperlänge 4,3—8,0 Mill.

Mittelasien östlich von Syr-darja, ostwärts bis zum Alma-ata (Vernyj).

*Messor barbarus meridionalis* var. *inermis* nov.

Thorax mehr oder weniger verdunkelt, bisweilen (bei mehreren Individuen aus Dshlety'ssu) fast ganz schwarz. Körperlänge veränderlich, von 4,5 bis 8,0 Mill.

Ueber die Ebenen und trockenen Vorgebirge vom nord-östlich Turkestan weit verbreitet und ist sandhaltigen und lehmhaltigen, mit Graswuchs oder Gras und Wermut bedeckten Gegenden des zentralen Turkestans sehr eigentümlich. Diese Form zeichnet sich biologisch durch äußerst starke Entwicklung der vom Nest nach allen Seiten radiär auseinander-