

Separat-Abzug aus Societas entomologica.
1927. Jahrg. 42 pag. 26 - 28.

57. 96 Proformica (57. 6)

Zur Kenntnis der Gattung Proformica Ruzsky.

Von N. Kusnezow-Ugamsky.

Proformica nitida n. sp. ♂ major. Kopf nach unten deutlich verschmälert, mit schwach gebogenen Seiten und breit abgerundetem Hinterrand. Hinterecken des Kopfes sehr schwach angedeutet. Clypeus schwach gekielt, fast ganz glatt, glänzend, nur an den Seiten mit einer leichten Längsstreifung; Vorderrand in der Mitte ohne Ausrandung, nach vorn stumpfwinkelig herabreichend. Stirnleisten sehr schwach. In der Mitte der Stirn, von den unteren Nebenaugen bis zum Clypeus, geht eine schmale längliche Furchung. Augen mittelgroß, stark gewölbt. Maxillartaster vgl. Fig. 5.

Fühlerschaft dünn und sehr lang, den Hinterrand des Kopfes um seine Länge überragend. Fühlerschaft und Fühlergeißel mit zahlreichen anliegenden Härchen bedeckt; diese Härchen sind dünner als bei anderen Arten. Thorax schlank, ohne wahrnehmbare Skulptur, glatt und glänzend, mit zerstreuter weißlicher anliegender Behaarung. Horizontale Basalfläche des Epinotums länger, als die abschüssige. Uebergang zwischen basaler und abschüssiger Fläche ist gleichmäßig konvex, ohne wahrnehmbaren Winkel. Basalfläche in der Mitte mit einer schwachen queren Einsenkung. Schuppe des Petiolus ziemlich dick, am Oberrand nicht scharf, aber im Profil betrachtet nach oben stumpf abgerundet. Oberrand mit schwach vertiefter Ausschnidung in der Mitte, bisweilen fehlt diese gänzlich.