

basis. Kopf und Thorax, samt den Beinen ziegelrot, mehr oder weniger gebräunt. Abdomen dunkel schwarzbraun. Körperlänge 2,8—3,5 mm.

Stadt Turkestan, Löß-Wüste. 7. 7. 1923.

Analytische Uebersicht der bis jetzt aus Turkestan bekannten Arten (♂).

1. Obere Hälfte des Kopfes glatt, stark glänzend, manchmal mit kleineren, einzeln vertieften Grübchen 2

— Obere Hälfte des Kopfes mit deutlich wahrnehmbarer Skulptur, schwach glänzend oder matt 3

2. Obere Hälfte des Kopfes ohne Skulptur. Größere Art.

1. *Proformica nitida* n. sp.

— Obere Hälfte des Kopfes mit einzelnen, kleinen, punktförmigen Grübchen

P. nitida var. *alpina* nov.

3. Oberseite des Kopfes mit grober Längsrünzelung 4

— Andere Skulptur mit vertieften punktförmigen Grübchen 5

4. Clypeus ohne Längskiel. Fühlerschaft mit zahlreichen anliegenden Haaren bedeckt.

2. *P. coriacea* n. sp.

— Clypeus mit Längskiel. Fühlerschaft mit abstehenden Haaren.

3. *P. aberrans*, Mayr.

5. Epinotum mit grober Querrünzelung. Bei ♂ major das vierte Maxillartasterglied beinahe zweimal so lang als das fünfte.

4. *P. epinotalis* n. sp.

— Epinotum glatt oder nur mit feiner Querrünzelung. Bei ♂ major das vierte Maxillartasterglied kürzer, nur ein wenig länger als das fünfte 6