

RECORDED
IN ANTBIS

Н. Н. Кузнецов-Угамский.

Материалы по мирмекологии Туркестана. III *).

(С 23 рис.)

N. N. Kuznetzov - Ugamskij.

Beiträge zur Kenntnis der Myrmekologie von Turkestan. III *).

(Mit 23 Fig.)

5. Род *Acanthomyops* Mayr (*Lasius* auct.).

1. Tief-schwarz, stark glänzend. Hinterleib nur mit kurzen, abstehenden Haaren besetzt. Hinterrand des Kopfes ausgeschnitten. Körperlänge 4—5 mm. *A. fuliginosus* Latr.
— Anders gefärbt, nur wenig glänzend, meist reichlich anliegend behaart. Hinterrand des Kopfes weniger stark ausgeschnitten oder gleichmässig gewölbt. 2
2. Maxillarpalpen sehr kurz, die Occipitalöffnung nicht erreichend. Körper gelb. 3
— Maxillarpalpen länger, die Occipitalöffnung erreichend. Körper dunkler gefärbt, schmutzig-gelb, bräunlich-gelb bis schwarz . . . 4
3. Epinotum im Profil betrachtet eckig. *A. flavus* F.
— Epinotum im Profil betrachtet abgerundet. *A. carniolicus* Mayr.
4. Fühlerschaft und Schienen mit abstehenden Haaren. 5
— Fühlerschaft und Schienen ohne abstehende Behaarung 7
5. Ganz bräunlich schwarz. Matt oder höchstens sehr schwach glänzend. Körperlänge 2,8—4 mm. *A. niger* L.
— Körper heller gefärbt oder, wenn dunkel, so ist er deutlich glänzend. 6
6. Dunkel-braun, spärlich behaart und deutlich glänzend. Körperlänge 2,8—3,3 mm. *A. niger nitidus*, sbsp. n.

*) Ср.: Русск. Энт. Обзор., XX, 1926, стр. 93—100; XXI, 1927, стр. 33—42.