

— Брүнlich-желб, нур Копф и Абдомен етвас глänzенд. Көрперlänge 3—3,5 mm. *A. niger flavescens* For.

7. Көрпер hellgelb, Abdomen und Oberseite des Kopfes етвас dunkler. Fühlerschaft und Beine mit zerstreuten abstehenden Behaarung. Көрперlänge ♀ 2,5—3 mm. *A. niger emeryi* Ruz.

— Көрпер schmutzig-gelb oder bräunlich, mehr oder weniger dunkel. Behaarung meist reichlicher. 8

8. Thorax bräunlich-gelb. Kopf und Abdomen dunkel-braun. Stirnrinne deutlich bis zum vorderen Punktauge. Көрперlänge 2,7—3,8 mm.

A. niger brunneus Latr.

— Көрпер anders gefärbt. Stirnrinne undeutlich 9

9. Schwärzlich-braun. Etwas grösser, Көрперlänge 2,5—3,4 mm.

A. niger alienus Foerst.

— Көрперfärbung heller. Kleiner, Көрперlänge 2,2—3,0 mm.

A. niger lasioides Em.

1. *Acanthomyops fuliginosus* Latr. — Гавриловка (ныне Талды-Курган) в северо-восточном Семиречьи в предгорьях Джунгарского Алатау (1922, П. П. Архангельский).

До сих пор этот бореальный вид, экологически связанный с лиственными лесами, для Туркестана не указывался; в Сибири, по данным Рузского, обитает в березовых лесах по преимуществу; туркестанские экземпляры вполне сходны с имеющимися у меня экземплярами из Московской губернии. Вообще вид чрезвычайно стойкий в своих признаках; только на Дальнем Востоке (Южно-Уссурийский край) обитает недавно мною описанный особый подвид *A. fuliginosus capitatus*, nov. (рукопись).

2. *A. flavus* De Geer. — В литературе до сих пор этот вид для Туркестана указан только один раз, да и то для var. *fuscoides* Ruzsk у, отличающейся от типичной формы более или менее выраженным коричневатым тоном окраски тела; за последние годы однако вид был обнаружен в других местах, при чем на ряду с типичной формой встречалась и var. *fuscoides* Ruz.

Местонахождения: *A. flavus* typ.: Каркара, 15. VIII. 1924 (отмечены крылатые самки); между Лепсинском и Тополевкой, 28—VII. 1922, крылатые самцы (П. П. Архангельский). — *A. flavus* var. *fuscoides*: бывший монастырь на берегу Иссык-куля: Больш. Джаргылчаб на южн. бер. Иссык-куля; Джаланаш; перевал Кизилкия. Следует отметить, что все экземпляры из этих местонахождений не были вполне типичными, представляя скорее переход к типу вида.

3. *A. carnolicus* Maug. — Дау-Баба в предгориях Таласского Алатау, километрах в 60 на восток от Чимкента; найдено две колонии под камнями на обращенном к югу склоне горы на высоте 800—1 000 метров над уровнем моря. Экземпляры этого вида посылались мной покойному С. Ешегу, который нашел, что это особый подвид, если даже не вид. Однако ни изучение описаний, ни срав-