

нение с экземплярами *A. carniolicus* в Зоологическом Музее Академии Наук не дали мне оснований говорить о возможности выделения туркестанских экземпляров в особую систематическую единицу; весьма возможно, что Емери принял их за представителей особой формы только на основании географических соображений, считая невозможным, чтобы этот редкий и спорадический вид в неизменной форме мог существовать и в Туркестане. Нахождение этого вида в Южно-Уссурийском крае (август 1926), наоборот, такую возможность делает весьма вероятной, так как в целом вид расселен очень широко.

4. *A. niger* L. s. ext. — Весьма дифференцированный бореальный цикл форм, являющийся наиболее частым представителем рода в Туркестане, главным образом в горах его восточной половины.

*A. niger* L. s. str. — Окр. Борохудзира; Джаркент; Тополевка Лепсинск. у.; Баскунчи; Каракол; перевал Кизил-кия; Алма-Ата; долина р. Каркары; урочище Чуваржан на р. Тюп; горы в окрестностях Алма-Ата; долина Дженишке в Заилийском Алатау. В литературе указаны: Самарканд; перевал Караказук (Мауг, 1877); Асхабад (Fogel; указание сомнительно); Джасыл-куль в Заил. Алатау 1700 метров (Караваев).

*A. niger nitidus*, sbsp. nov. — Skulptur der Körperoberfläche undeutlich. Kopf und Thorax glänzend, nur spärlich mit den feinen halbanliegenden Härchen bedeckt. Färbung dunkel-braun, fast schwärzlich-braun. Körperlänge 3—3,2 mm.

Горы в районе озера Бахман-куль в верховьях реки Угам (зап. Тянь-Шань). На высоте около 2 километров над уровнем моря. Не совсем типичные экземпляры, представляющие переход к *A. niger alienus*, менее блестящие и с более обильным опушением поверхности тела найдены: Ходжекент, в 65 км к сев.-вост. от Ташкента; дол. реки Кара-су в северо-восточной части Наманганского уезда.

*A. niger flavescens* Fog. — Шугнан, р. Гунт, Сардым; Кара-гурум-Мазар; Рошан, Марджанай (Fogel, 1903). Повидимому, эта форма свойственна горам Таджикистана. Мне она ни разу не встречалась.

*A. niger emeryi* Ruzsky. — Памир; Дамбурачи в Таджикистане (Рузский, 1905), Мин-Булак и Чимган в западном Тянь-Шане. Горная форма, которую, вероятно, следует квалифицировать в качестве морфы.

*A. niger brunneus* Latr. — Царицынский перевал в западных предгорьях Джунгарского Алатау, 15. VII. 1922, рабочие, а также крылатые самцы и самки (П. П. Архангельский). Кара-Джунт в Алма-Атинском уезде; аул Тепар в долине реки Пскем в зап. Тянь-Шане.

*A. niger alienus* Foerst. — Озеро Искандер-куль; Шахимардан; река Искандер (Мауг, 1877). Асхабад (Fogel, 1903); окрестн. Аральского моря: Уч-чоку, сев. берег, в песке; Асхабад; Нов. Маргелан; Кштут; Таджикистан: Дамбурачи; Памир (Рузский, 1905). Бывший