

6. Под *Myrmica* Latr.

1. Fühlerschaft an der Basis geknickt, an der Knickungsstelle mit deutlichem Zahne oder Lappen. Fühlerkeule dreigliedrig . . . . . 6  
 — Fühlerschaft an der Basis in flachem Bogen gekrümmt. Fühlerkeule viergliedrig . . . . . 2

2. Grösser (Körperlänge 4,4 — 5,5 mm). Keule nicht sehr stark verdickt. Rötlich-braun; Kopf und Abdomen bräunlich-schwarz. Clypeus vorn abgerundet . . . . . *M. bergi* Ruzsky.

— Kleiner (Körperlänge 3,2 — 5,0 mm). Anders gefärbt Clypeus vorn abgerundet oder eckig vorgezogen. . . . . 3

3. Dunkler gefärbt. Clypeus vorn eckig vorgezogen. Kleiner, Körperlänge 3,2 — 4,5 mm. . . . . 4

— Heller gefärbt. Clypeus vorn gleichmässig abgerundet. Etwas grösser (Körperlänge 3,5 — 5,0 mm). . . . . 5

4. Erstes Petiolusglied oben abgerundet. Kopf schmaler. Petiolus kürzer gestielt . . . . . *M. rugosa smythiesi* For.

— Erstes Petiolusglied oben eckig; vorn länger gestielt. Kopf kürzer und breiter. Clypeus nach vorn stärker vorgezogen . . . . .

*M. rugosa dshungarica* Ruz.

5. Abschüssige Fläche des Epinotums zwischen Dornen glatt und glänzend. Zweites Petiolusglied glänzend . *M. rubra laevinodis* Nyl.

— Abschüssige Fläche des Epinotums fein quergestrichelt. Zweites Petiolusglied ziemlich matt, mit einigen Längsfurchen . . . . .

*M. rubra ruginodis* Nyl.

6. Fühlerschaft an der Knickung mit einem kleinen zahnartigen Vorsprung. Körper oben schwarz oder höchstens schwärzlich-braun. Beine, Antennen, Thoraxseiten und Mandibeln rötlich. Körperlänge 3,5 — 4,5 mm. . . . . *M. scabrinodis saposchnikovi* Ruz.

— Fühlerschaft verschieden gestaltet. Körper anders (heller) gefärbt . . . . . 7

7. Thorax hell rötlich-gelb. Fühlerschaft an der geknickten Stelle breit lappenförmig ausgezogen. Epinotumdornen lang. Stirnfeld glatt und stark glänzend. Körperlänge 3,7 — 4,8 mm. . . . .

*M. scabrinodis intermedia*, nov.

— Thorax dunkler gefärbt oder, wenn hell, so ist an der geknickten Stelle der Fühlerschaft nur schwach ausdehnender Zahn. Stirnfeld glatt oder fein längsgestrichelt. . . . . 8

8. Epinotumdornen länger als die Basalfläche des Epinotums. Körperfärbung heller. Länge 3,5 — 5,0 mm. . . . .

*M. scabrinodis scabrinodis* Nyl.

— Epinotumdornen kürzer als seine Basalfläche. Körperfärbung etwas dunkler. Länge 4,5 — 6 mm. . *M. scabrinodis lobicornis* Nyl.