

между их основаниями, прямые или слегка загнутые. Окраска тела обычно красновато-коричневая с более темным верхом головы и брюшком; иногда светлее, до грязно-желтой.

Самка. Длина тела 4,5—5,7 мм. Основной тон окраски темно-бурый, почти черный; усики, верхние челюсти, ноги и оба членика стебелька ржавчинно-красные, коричневатые; часто задние края сегментов брюшка более или менее бледные. Заднегрудь по большей части желтовато-красная; такого же цвета пятна различной величины на щитке и среднеспинке. Усики явственно с 4-члениковой булавой, покрытые густым и тонким полуприлегающим серебристым опушением. Голова грубо морщинистая, матовая, только лобная площадка гладкая и блестящая. Среднеспинка и бока груди довольно правильно продольно-морщинистые. Шипы заднеспинки короткие, при основании расширенные, на конце притупленные. Первый членик стебелька сверху с острым углом; передняя его поверхность слабо вогнутая, задняя заметно выпуклая. Второй членик округленный. Оба грубо и неправильно морщинистые, слабо блестящие. Брюшко гладкое, с сильным блеском. Все тело довольно равномерно покрыто рассеянным отстоящим опушением.

Самец. Длина 4,2—5 мм. Весь черный; мандибулы перед концом красноватые; конец усиков и ноги буроватые. Голова округлая, с сильно сглаженными боковыми углами и выпуклыми боковыми и затылочным краем; вся грубо и неправильно сетчато-морщинистая, матовая, только по середине лба имеется несколько более правильных продольных морщинок; лобная площадка с блеском, под микроскопом ее поверхность очень тонко сетчатая. Верх груди с сильно сглаженной скульптурой, частично даже гладкий и сильно блестящий. Бока груди с довольно правильными продольными морщинами. Бока заднеспинки только со слабыми бугорками. Иногда, впрочем, имеются очень короткие притупленные на конце зубчики: var. *dentata*, nov. ♂ — Джаланаш, Тургень; иногда же эти зубчики более выдаются и на конце заострены: var. *subacuta*, ♂ nov. — Джаланаш.

Каково систематическое значение этих форм самцов, сказать трудно, тем более, что рабочие во всех случаях оказываются сходными и отклонения в строении тела последних не выходят за пределы индивидуальных изменений.

*M. rugosa dshungarica infuscata*, var. nov. — ♀. Körper dunkel-braun, fast schwarz. Beine, Mandibeln, letztes Fühlerglied und die Hinterränder der Bauchsegmenten etwas heller. Erstes Petiolusglied im Profil gesehen eben oder wenig ausgeschnitten (nicht gewölbt wie bei *M. rugosa dshungarica*). Epinotumdornen verschieden gestaltet, bisweilen ein wenig nach unten gebogen. Körperlänge 4,8—5,0 mm. — ♀. Körperlänge 3,5—4,5 mm. Stimmt mit dem Typus überein. Erstes Petiolusglied sehr verschiedenartig gebaut: seine hintere Fläche entweder eben, oder gewölbt.

Район распространения ее прослеживается по южному берегу Иссык-Куля от Джитыгуза до Тона. Там же одновременно встре-