

чается и типичная форма вида. Местонахождения: Ат-джайлау в бассейне Джитыгуза, выс. 2 700 — 3 000 метров; басс. р. Тон, Айнабулак; Барскоун.

*M. rugosa dshungarica brevispina*, var. nov. — Epinotumdornen kürzer als bei typischer *M. rugosa dshungarica*, nahe der Basis stark verdickt, zum Ende aber schnell verjüngt und zugespitzt. Etwas kleiner als typische Form; Körperlänge 3,2 — 3,6 mm. Rötlich-braun; Kopf (mit Ausnahme der Antennen und Oberkiefer) und Abdomen schwärzlich-braun, oben fast schwarz. Erstes Petiolusglied oben eckig, wie bei typischer Form.

Найдены только рабочие. Таксономическое значение неясно. Чегедек (южн. берег Иссык-куля).

*M. rugosa smythiesi* Fог. — Джунгарск. Алатау, дол. р. Юй-Тас, в верховьях р. Усека, близ верхней границы елового леса, 2 500 метров выс. и около альпийских лугов (Рузский, 1905). Указание нуждается в подтверждении.

### 3. *M. rubra* L.

*M. rubra laevinodis* Nyl. — Искандер-куль (Мауг). Окрестн. Арасана, Копальск. у.; окр. Копала, под камнем; Алма-Ата, в земле под камнями; Куянды в дол. р. Джебоглы-су. Типичная форма этого бореального вида более обычна только в северо-восточной части Семиречья, встречаясь в других местах лишь в виде исключения, только в горных местностях. Из Средней Азии указывается еще несколько эндемичных форм:

*M. rubra laevinodis ferganensis* Karaw. — (Караваяев, Русск. Энт. Обзор., XV, 1915, стр. 503 — 504) — Р. Киргизата, около 2 700 м.

*M. rubra laevinodis* var. *minuta* Ruiz. 1905. — Памир, перевал Андеманян.

*M. rubra laevinodis* var. *tenuispina* Fог. 1903 (Ежегод. Зоол. Музея Ав. Наук, VIII, 1903, стр. 374). — Кугарт, 1800 — 2400 м выс. Каратегин, Кала-и-хоит; Таби-дара-Сагырдешт; Дарваз Таш-курбан, Буль-и-калян, озеро системы Зеравшана (Рузский, 1905).

*M. rubra ruginodis* Nyl. — Окр. Самарканда: Панджикент; Анзоб на р. Ягноб; Шахимардан; Караказук; Алай, в конце июля Кичи-Алай; Гульча; Ургент (Мауг). В позднейшее время в Туркестане этот подвид никем не был найден и очевидно, что под этим названием у Мауг'а фигурирует какая-то иная форма; необходим просмотр экземпляров коллекции Федченко, обработанной Мауг'ом.

### 4. *M. scabrinodis* Nyl.

*M. scabrinodis saposhnikovi* Ruiz. (1904). — Сев. склон Джунгарского Алатау, дол. р. Баскана, 1000 м, густой еловый лес, окр. Джаркента (Рузский, 1905). Бассейн Иссык-куля: Уракыр, Барскоун, Джитыгуз, Джаланаш. Залийский Алатау: верховья р. Асы. Крылатые самцы и бескрылые самки в начале августа 1924 года в ущельи Барскоуна. Эта форма вместе с *M. rugosa dshungarica*